

THÈSE

PRÉSENTÉE

A LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE CLERMONT-FERRAND

POUR OBTENIR

LE GRADE DE

DOCTEUR ÈS-SCIENCES PHYSIQUES

PAR

Jean-Pierre FAURIE

Ingénieur-Chimiste E. N. S. C. C.

Licencié ès-Sciences

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE
DES SYSTÈMES $\text{Ag}_2\text{MO}_4\text{-MO}_3$, $\text{Ln}_2\text{O}_3\text{-M}'\text{O-MO}_3$
ET DES PHASES $\text{M}'\text{Ln}_4\text{M}_3\text{O}_{16}$ où $\text{M} = \text{M}_0$; W

Soutenue le mai 1970 devant la commission d'examen

M. A. CHRÉTIEN *Président d'honneur*

M. R. KOHLMULLER *Président*

M^{me} F. GAUME

M. G. TRIDOT

M. M. CAPESTAN

} Examineurs

THÈSE

PRÉSENTÉE

A LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE CLERMONT-FERRAND

POUR OBTENIR

LE GRADE DE

DOCTEUR ÈS-SCIENCES PHYSIQUES

PAR

Jean-Pierre FAURIE

Ingénieur-Chimiste E. N. S. C. C.

Licencié ès-Sciences

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE
DES SYSTÈMES $\text{Ag}_2\text{MO}_4\text{-MO}_3$, $\text{Ln}_2\text{O}_3\text{-M}'\text{O-MO}_3$
ET DES PHASES $\text{M}'\text{Ln}_4\text{M}_3\text{O}_{16}$ où $\text{M} = \text{M}_0$; W

Soutenue le mai 1970 devant la commission d'examen

M. A. CHRÉTIEN *Président d'honneur*

M. R. KOHLMULLER *Président*

M^{me} F. GAUME

M. G. TRIDOT

M. M. CAPESTAN

} Examineurs

THÈSE

PRÉSENTÉE

À LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE CLERMONT-FERRAND

POUR OBTENIR

LE GRADE DE

DOCTEUR EN SCIENCES PHYSIQUES

PAR

Jean-Pierre FAUPEL

Président du Jury : M. J. L. L.



CONTRIBUTION À L'ÉTUDE

DES SYSTÈMES AG-MO-ISO. CAS DE MO-MO
ET DES PHASES V-M-M-O DE M-M-M

M. A. CHATELAIN, Président du Jury
M. R. CHATELAIN, Membre du Jury
M. J. L. L., Membre du Jury
M. O. DROUOT, Membre du Jury
M. M. CHRISTIAN, Membre du Jury

UNIVERSITE de CLERMONT-FERRAND

FACULTE des SCIENCES

Doyen : M. KOHLMULLER

Assesseur : M. RACULT

PROFESSEURS

M. RAMBAUD René	Chimie
M. BLANC Eugène	Mathématiques pures
M. ROQUES Maurice	Géologie
M. LAPADU-HARGUES	Minéralogie
M. LUTZ Hubert	Biologie Animale
M. RACULT Gaston	Physique
M. CHAMPAGNAT Paul	Physiologie Végétale
M. DUPLÉSSIS-KRUGOVARD Alain	Chimie
M. AVAN Jean-Louis	Physique Expérimental
Mme HENNEQUIN Françoise	Mathématiques pures
Mlle BERTHET Ginette	Physique
M. LOISEAU Jean	Botanique
M. COMBE René	Physique
M. de PUYTORAC Pierre	Zoologie
Mme AVAN Madeleine	Physique
Mlle DONDON Marie-Louise	Chimie Physique
M. DELOST Paul	Physiologie Animale
M. VIALARD André	Chimie
M. KOHLMULLER Robert	Chimie Minérale
M. GUILLAUME Marcel	Algèbre
M. COMBE Jean	Physique
M. HENNEQUIN Paul	Mathématiques Appliquées
M. L'HÉRITIÉER Philippe	Génétique
M. VESPIÈRE Roger	Chimie Organique
M. BAILLAUD Lucien	Botanique
M. BERNARD Maurice	Physique
M. JOYON Louis	Zoologie I.U.T.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41548424_0013

PROFESSEURS SANS CHAIRE

M. PETERLONGO Jean-Marc	Géologie
M. BATHIER Marcel	Physique
Mlle DUCHER Suzanne	Chimie
M. FALGAS Maurice	Mathématiques pures
M. MARTINET Pierre	Chimie
M. MAISONNEUVE Jacques	Géologie
M. CAPESTAN Michel	Chimie
M. LENOIR Marcel	Mathématiques pures
M. THOMAS Jean	Physique
M. ISABELLE Didier	Physique
M. CAUBERE Paul	Chimie
M. ROCHE Jean	Physique I.U.T.

MAITRES de CONFERENCES

M. SOULAGE René	Géophysique générale
M. DUFAURE Jean-Pierre	Zoologie
M. BADRIKIAN Albert	Mathématiques Appliquées
M. COURDUROUX Jean-Claude	Botanique
M. GRAIN Jean	Zoologie
Mme BESSERRE Anne-Marie	Mathématiques pures
M. JEAN Claude	Physiologie Animale
M. LE THAN PHONG	Mathématiques pures
M. MIGNOT Jean-Pierre	Zoologie
M. VELLEJ Georges	Psycho-physiologie
M. COUSSEINS Jean-Claude	Chimie
M. LEMAIRE Jacques	Chimie
M. CHADEYRAS Marcel	Mathématiques pures
M. BOILLAT Guy	Mathématiques pures

MAITRES de CONFÉRENCES

M. CADOR T Robert	Physique
M. LE MEN Jean-François	Physique
M. GAGNY Claude	Géologie
M. GUILLOT Albert	Biologie Appliquée - I.U.T.
M. NIGONL	Agronomie - I.U.T.

CHARGES d'ENSEIGNEMENT

M. COFFI N'KETSIA Barben Jean	Mathématiques pures
M. AUSLENDER Alfred	Mathématiques Appliquées
M. FANGUIN René	Physique - I.U.T.
M. LETAC	Informatique - I.U.T.

ATTACHE PRINCIPALE

Mme CHOPART Marie-Louise

à mon Maître Monsieur le Professeur KOHLMULLER

à ma grand-mère

à ma femme

à mes fils

à ma famille

Ce travail a été effectué dans le laboratoire du Service
de Chimie Minérale dirigé par

Monsieur Le Professeur KOHLMULLER

Que mon maître veuille bien trouver ici l'expression de
ma profonde gratitude pour l'appui qu'il m'a prodigué et l'intérêt
qu'il n'a cessé de porter à mon travail

Monsieur Le Professeur CHRISTIAN de la Faculté des
Sciences de Paris

Madame GAULLE, Directeur de Recherche au Laboratoire
de Spectroscopie et de luminescence de l'Université
de Lyon

Monsieur Le Professeur TRIDOT, Directeur de l'Ecole
Nationale Supérieure de Chimie de Lille

Monsieur Le Professeur CAPESTAN de la Faculté des
Sciences de Clermont-Ferrand

m'ont fait le grand honneur de faire partie du Jury de cette Thèse.

Je les assure de ma respectueuse reconnaissance.

L'étude de Luminescence Cristalline a été réalisée au
Laboratoire de Spectroscopie et de Luminescence de l'Université
de Lyon grâce à la bienveillance de

Madame GAUNE,

qui m'y a accueilli, ainsi qu'aux critiques, aux conseils et à
la collaboration qu'elle n'a cessé, avec

Madame LINARES,

d'apporter à ce travail.

Qu'elles veuillent bien trouver ici l'expression de mes
remerciements les plus vifs.

Je remercie également Monsieur CADCRET, Maître de Conférence
à la Faculté des Sciences de Clermont, pour les conseils qu'il m'a
donné ainsi que tous mes camarades du Service pour le climat d'amitié
dont ils ont su m'entourer.

Mes remerciements vont aussi au Centre National de la
Recherche Scientifique, qui m'a permis d'accomplir ce travail
dans les meilleures conditions.

I N T R O D U C T I O N

-:-:-:-:-:-:-:-

Depuis une vingtaine d'années la chimie concernant les divers oxydes de molybdène s'est enrichie de nombreuses publications tant en ce qui concerne l'étude de molybdates métalliques, de phases appelées bronzes que de systèmes avec d'autres oxydes.

Certains de ces molybdates sont utilisés dans la fabrication de rasers tandis que d'autres, ayant une structure du type scheelite (CaWO_4), obtenus assez facilement sous forme de monocristaux et dopés au Néodyme (Nd^{3+}) ou au Praséodyme (Pr^{3+}) ont un effet laser intéressant.

En U.R.S.S. l'étude des systèmes $\text{MoO}_3 - \text{MO}$ est entreprise depuis 1954 par diverses équipes dont une, dirigée par A.N. ZELIKMAN est l'auteur de nombreuses publications (1)(2)(3).

Depuis quelques années, les composés du type $\text{M}^{\text{I}}\text{Ln}^{\text{III}}(\text{MoO}_4)_2$ et $\text{M}^{\text{I}}\text{Ln}^{\text{III}}(\text{WO}_4)_2$ (où $\text{M}^{\text{I}} = \text{Li}, \text{K}, \text{Na}$ et $\text{Ln}^{\text{III}} =$ terres rares) sont très étudiés car la plupart de ces phases sont du type scheelite (4)(5)(6)(7)(8).


Depuis 1960 les chercheurs de la Société Bell Telephone obtiennent des monocristaux, des molybdates et tungstates MMoO_4 , des métaux de transition (Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) par la méthode d'étirement de CZOCHRALSKI. Ces monocristaux ont été très étudiés pour leurs propriétés physiques et en particulier leur résistivité (9)(10)(11)(12).

Les molybdates présentent en outre des structures très diverses, parfois complexes, puisque celles de ZnMoO_4 et CuMoO_4 ne sont connues que depuis 1967 et 1968 (13)(14). La confusion considérable quant aux relations qui existent entre les structures des molybdates du type MMoO_4 qui a subsisté jusqu'à ces dernières années (64)(65) n'est pas encore totalement éliminée.

Sur un certain nombre de systèmes binaires nous ne possédions que des résultats soit très fragmentaires; à savoir la connaissance de la structure du composé 1:1 (Ag_2MoO_4 , Ag_2WO_4 , CdMoO_4); soit divergents quant aux systèmes MoO_3 -CuO et MoO_3 -ZnO ; c'est pourquoi nous avons entrepris leur étude. Depuis la publication de nos travaux les résultats obtenus par d'autres chercheurs ont contribué à faire la lumière sur certains points restés imprécis.

Il semblait intéressant de poursuivre notre travail de recherche par l'étude de systèmes ternaires puisque nous

possédions alors des informations parfois très complètes sur les systèmes binaires et en particulier sur les suivants :



C'est au cours de ces recherches que nous avons obtenu des phases du type fluorine. Le nombre de composés obtenus ainsi que la diversité des substitutions possibles ont déjà permis de faire d'intéressantes comparaisons et pourront faire l'objet d'un travail de recherche futur plus approfondi.

Nous avons entrepris d'étudier ces phases en ce qui concerne leur préparation, leur domaine d'existence et leur stabilité thermique ainsi que leurs structures : par diffraction de rayons X ; par absorption Infra-Rouge, par leur émission en luminescence cristalline lorsqu'ils sont activés à l'aide de l'ion Eu^{3+} et par magnétochimie.

Notre travail présente trois chapitres :

- Le premier est consacré à l'étude des binaires $\text{MoO}_3 - \text{MO}$ ($\text{M} = \text{Cu}, \text{Zn}, \text{Cd}$) $\text{MoO}_3 - \text{Ag}_2\text{MoO}_4$; $\text{WO}_3 - \text{Ag}_2\text{WO}_4$ avec établissement de leurs diagrammes thermiques ainsi que des systèmes $\text{WO}_3 - \text{CuO}$ et $\text{MoO}_3 - \text{WO}_3 - \text{CuO}$.



- Le second est relatif à l'étude des phases fluorines.

- Le troisième fait état de la préparation de composés de départ ainsi que des techniques d'études utilisées.



C H A P I T R E I

-:-:-:-:-

DIAGRAMMES d'EQUILIBRE LIQUIDES - SOLIDES des SYSTEMES BINAIRES




ETUDE dans L'ETAT SOLIDE des SYSTEMES



Le système est difficile à établir par suite de dégagement d'oxygène dès que le mixte devient liquide.

Cette perte d'oxygène mise en évidence par thermogravimétrie correspond à la réaction :



Par refroidissement lent après fusion le produit reprend quantitativement son oxygène, reprise facilitée par agitation sous courant d'oxygène. Dans ces conditions, les résultats sont reproductibles à l'échauffement quel que soit leur nombre.

Dans le tableau II sont donnés les résultats obtenus en analyse thermique simple (A.T.S.) et en analyse thermique différentielle (A.T.D.) pour quelques concentrations.

Les points caractéristiques du diagramme (fig. 1) sont les suivants :

TABEAU III

	:	E	:	T ₁	:	T ₂
	:		:		:	
TEMPERATURE (°C)	:	700 - 710	:	850	:	870
	:		:		:	
MOLES CuO %	:	24	:	48	:	55
	:		:		:	

TABLÉAU II

—°—°—°—°—

CuO (moles %)	TEMPERATURE des ACCIDENTS THERMIQUES(°C) en A.T.S. sous O ₂					TEMPERATURE des ACCIDENTS THERMIQUES(°C) en A.T.D. sous O ₂					PHASES en PRESENCE
	L	T ₁	T ₂	FUSION ou PERTE d'OXYGÈNE		T ₁	T ₂	FUSION ou PERTE d'OXYGÈNE			
10	542	702			780 (F)						MoO ₃ +CuMoO ₄
20	548	705			740 (F)						"
25	545	710			713 (F)						"
30	548	705			760 (F)						"
33,3	548	695			793 (F)						"
40	548	700			823 (F)						"
50	548		850			550	835		840 (F)		CuMoO ₄
55	548		850	870							CuMoO ₄ +phaseβ
60				870	885 (P)		835	860	885 (P)		phaseβ
63,5				870	880 (P)			870	880 (P)		"
66,7				870	880 (P)			870	880 (P)		"
70				870	880 (P)						phaseβ+CuO
80				870	880 (P)						"
90				865							"

F : FUSION

P : PERTE d'OXYGÈNE

() : MESURES non REPRODUCTIBLES

Deux composés sont donc manifestés :

- Le premier MoO_3 , CuO à fusion incongruente
($t_f = 850^\circ\text{C}$)
- Le deuxième à fusion non congruente également,
qui d'après l'A.T.S., semble répondre à la
composition 2MoO_3 , 3CuO .

Postérieurement à la publication de notre diagramme (21) NASCAU et SHIEVER (23) ont publié un diagramme $\text{MoO}_3 - \text{CuO}$ qui manifeste trois composés : CuMoO_4 , Cu_2MoO_5 , et $\text{Cu}_3\text{Mo}_2\text{O}_9$, ce dernier n'apparaissant qu'à haute température. Ces auteurs indiquent que le palier de décomposition de $\text{Cu}_3\text{Mo}_2\text{O}_9$ coïncide avec l'invariant de décomposition de CuMoO_4 .

A - ETUDE de CuMoO_4

Ce composé possède une structure triclinique (14)

groupe spatial P_1

$Z = 6$

$a = 9,903 \text{ \AA}$
 $b = 6,783 \text{ \AA}$
 $c = 8,359 \text{ \AA}$

$\alpha = 101,08^\circ$
 $\beta = 96,88^\circ$
 $\gamma = 107,05^\circ$

La préparation de monocristaux de CuMoO_4 a intéressé un certain nombre de chercheurs mais leur obtention fut assez délicate à cause de leur fusion incongruente (9). Il semble que les premiers à y avoir réussi furent KOSEK et Coll. (20). Ils ont utilisé pour cela la méthode de BRIDGMAN qui consiste très schématiquement à introduire de la poudre de CuMoO_4 dans une ampoule de quartz scellée ; laquelle se trouve dans un four ayant un gradient de température de 60 à 80°C/cm et qui est refroidie à une vitesse de 10 à 30° C/heure. Les monocristaux de CuMoO_4 sont identifiés par la méthode de LAUE. En 1968, NASSAU et ABRHAMS (22) en obtiennent par la méthode de CZOCHRALSKY.

Le diagramme obtenu manifeste de plus un accident thermique à 550°C déjà signalé par BATRAKOV (18). Il ne s'agit pas d'une transition de phase car le spectre X à 700° est identique à celui obtenu à température ordinaire. NASSAU et SHIEVER (23) attribuent cet accident à un "équilibre incomplet avec l'atmosphère". TRAMBOUZE et Coll. (24) ont montré qu'il existe pour les molybdates de Ba, Zn, Ni, et Co des transitions entre 350 et 500°. La transformation est réversible, il n'y a pas de changement ni dans la composition chimique ni dans les spectres X et I.R., mais une cassure de la courbe densité = $f(\theta^\circ\text{C})$. Ils pensent que cette transition est associée au groupe MoO_3 .

B - MISE en EVIDENCE d'une PHASE HEXAGONALE

Un mixte fondu de composition CuO-MoO_3 , trempé à l'air conduit à l'obtention de fines plaquettes marron clair. Des


conditions particulières sont à respecter à savoir : le composé CuMoO_4 est porté dans un grand creuset en platine à fusion à une température de 1000°C environ sur un bec MECKER ; nous mouillons les parois du creuset avec le liquide de manière à ce qu'une fine pellicule liquide tapisse son intérieur et nous le sortons brutalement à l'air ; la pellicule noire se solidifie et donne naissance à de petites plaquettes marron clair.

Ce produit est très bien cristallisé et présente un spectre de rayons X dont les raies peuvent s'indiquer dans le système hexagonal avec pour paramètres :

$$\begin{aligned} a &= 18,570 \text{ \AA} \\ c &= 6,723 \text{ \AA} \end{aligned}$$

Ce spectre est extrêmement dépouillé avec de nombreuses extinctions (tableau IV).

Ce composé est vraisemblablement issu de CuMoO_4 avec perte d'oxygène ce qui correspondrait à la formule CuMoO_{4-x} ($0 \leq x \leq 0,5$). Ceci est à rapprocher du composé $\text{Cu}_3\text{Mo}_2\text{O}_{7,5}$ signalé par quelques auteurs (16)(19)(23) obtenu à partir de $\text{Cu}_3\text{Mo}_2\text{O}_9$ (3CuO , 2MoC_3) par perte de l'oxygène correspondant à la réaction :



Remarque : Si les conditions particulières de trempe indiquées ci-dessus ne sont pas respectées, le produit obtenu est CuMoO_4 triclinique.

TABLÉAU IV

---:---

CuMoO _{4-x} phase haute température $0 \leq x \leq 0,5$						
Système cristallin = hexagonal $a = 18,570 \text{ \AA}$ $c = 6,723 \text{ \AA}$						
h k l	:	d _{obs} (Å)	:	d _{cal} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 0 0	:	8,04	:	8,04	:	5
0 0 1	:	6,722	:	6,723	:	22
2 1 0	:	6,0787	:	6,0787	:	27
0 0 2	:	3,363	:	3,362	:	100
4 2 0	:	3,0394	:	3,0393	:	94
0 0 3	:	2,2401	:	2,241	:	65
6 3 0	:	2,0247	:	2,0262	:	65
0 0 4	:	1,6794	:	1,6808	:	9
8 4 0	:	1,5196	:	1,5196	:	6
0 0 5	:	1,3442	:	1,3446	:	14
10.5.0	:	1,2156	:	1,2157	:	11
	:		:		:	
	:		:		:	

C - ETUDE du DOMAINE COMPRIS entre 60 et 67 MOLES CuO p-100

a) Etude dans l'état solide

Ce domaine étant très étroit (7% en CuO) les résultats donnés soit par A.T.S. soit même par A.T.D. ne permettent pas de le préciser. Par réaction dans l'état solide ; chauffage à 650° pendant 24 heures des mixtes CuO-MoO₃, on obtient des spectres identiques dont les raies du Tableau V peuvent s'indexer dans un système orthorhombique (phase β) avec :

$$d_4^{24} = 4,67 \quad Z = 8$$

$$\begin{aligned} a &= 14,842 \text{ \AA} \\ b &= 14,648 \text{ \AA} \\ c &= 6,869 \text{ \AA} \end{aligned}$$

NASSAU et SHIEVER (23) trouvent également une phase identique à la notre dont ils donnent seulement les distances inter-réticulaire mais qu'ils identifient à Cu₂MoO₅.

Il y a ambiguïté sur la composition de la phase . Il peut s'agir soit de Cu₃Mo₂O₉, soit de Cu₂MoO₅ ou bien d'une phase non stoechiométrique. Le diagramme MoC₃-CuO manifeste un arrêt de l'invariant T₁ pour 60 moles CuO % ce qui serait en faveur de l'existence de Cu₃Mo₂O₉. Malheureusement, les spectres X ne peuvent lever l'incertitude car les raies correspondant à CuO coïncident avec celles de la phase β . Signalons également que

TABLEAU V

-:-:-:-

(Cu ₃ Mo ₂ O ₉ - Cu ₂ O O ₅) PHASE β				
a = 14,842 Å b = 11,648 Å c = 6,869 Å				
hkl	d _{mes} (Å)	d _{th} (Å)	I/I ₀ Cu ₂ Mo O ₅	I/I ₀ Cu ₃ Mo ₂ O ₉
020	7,333	7,324	19	27
001	6,873	6,869	6	7
221	4,152	4,152	5	5
320	4,096	4,099	} 21	30
230	4,077	4,079		9
031	3,9796	3,9797	13,5	9
131	3,8437	3,8439	49	71
400	3,7107	3,7105	54	64 → CuMoO ₄ (3,744) raie 100
040	3,6626	3,6620	44	35
321	3,5254	3,5203	84	71
002	3,4345	3,4345	100	64
{102	3,3457	3,3461	} 75	50
{012	3,3457	3,3438		95
420	3,3092	3,3099	100	100
{401	3,2639	3,2646	} 25	46
{112	3,2639	3,2620		25 → CuMoO ₄ (3,151) raie 50
022	3,1099	3,1095	25	61
212	3,0557	3,0486	76	54
421	3,0180	2,9818	43	6 → CuMoO ₄ (2,897) raie 30
312	2,7708	2,7704	} 33	47
{250	2,7280	2,7249		5
{501	2,7280	2,7248	} 3	23
051	2,6945	2,6947		61
151	2,6496	2,6514	26	49 → CuO (2,5265)
521	2,5572	2,5538	65	
{350	2,5210	2,5208	} 65	
{402	2,5210	2,5205		

TABLÉAU V (Suite)

---:---:---:---:---:---:---:---

(Cu ₃ Mo ₂ O ₉ - Cu ₂ Mo O ₅)			PHASE β	
a = 14,842 Å b = 14,648 Å c = 6,869 Å				
hkl	d _{mes} (Å)	d _{th} (Å)	I/I ₀ Cu ₂ Mo O ₅	I/I ₀ Cu ₃ Mo ₂ O ₉
042	2,5060	2,5051	74	58
{600	2,4713	2,4737	34	25
{142	2,4702	2,4702	35	36
422	2,3840	2,3833	31	11 → CuO 2,3189
{601	2,3247	2,3273	26	29
{260	2,3190	2,3190	3	3
{161	2,2732	2,2732	10	13
{103	2,2684	2,2628	13	23
{013	2,2622	2,2622	45	75
261	2,1994	2,1972	{23	16
522	2,1493	2,1471	9	28
223	2,0969	2,0963	8	8
{071	2,0017	2,0017	8	8
{323	2,0001	1,9990	{10	11
{233	1,9966	1,9966	10	11
162	1,9729	1,9722	{15	15
641	1,9648	1,9642	39	52
403	1,9489	1,9485		
{271	1,9317	1,9326		
{413	1,9315	1,9315		
{650	1,8989	1,8900		
{560	1,8855	1,8855		
{423	1,8915	1,8833		
{800	1,8503	1,8552		
{362	1,8461	1,8461		
080	1,8328	1,8310		

→ CuO 2,3189

→ CuO 1,8681 (existe pour la composition Cu₂ Mo O₅)

pour 66,7 moles CuO_2 le spectre est identique. Seule l'intensité de quelques raies varie, particulièrement celles correspondant à CuO .

Seule une étude sur monocristal pourrait résoudre ce problème.

b) Etude à Fusion

La fusion suivie d'un refroidissement lent sous oxygène de mixtes dont le pourcentage en CuO varie de 57 à 67 % conduit à la formation d'aiguilles bleu-noir (phase α) de structure orthorhombique (16) affinée (23) avec :

groupe spatial $C_{2v}^9 - Pna\ 2_1$

$$\begin{aligned} a &= 7,64 \overset{\circ}{\text{\AA}} \\ b &= 14,50 \overset{\circ}{\text{\AA}} \\ c &= 6,78 \overset{\circ}{\text{\AA}} \end{aligned}$$

Les auteurs (16)(23) après analyse indiquent qu'il s'agit du composé $\text{Cu}_3\text{Mo}_2\text{O}_9$. Nous confirmons ce résultat. Si le refroidissement ne s'opère pas sous oxygène un composé déficitaire en oxygène est obtenu. THOMAS et Coll. (16) l'identifie à $\text{Cu}_3\text{Mo}_2\text{O}_8$ et propose une structure orthorhombique avec :

groupe spatial $P_{2_12_12_1}$

$$\begin{aligned} a &= 11,02 \overset{\circ}{\text{\AA}} \\ b &= 17,58 \overset{\circ}{\text{\AA}} \\ c &= 5,03 \overset{\circ}{\text{\AA}} \end{aligned}$$

DOYLE et Coll. (19) ainsi que NASSAU et Coll. (23) obtiennent un spectre différent et proposent la formule $\text{Cu}_3\text{Mo}_2\text{O}_{7,5}$ ($\text{Cu}_6\text{Mo}_4\text{O}_{15}$). Une analyse thermogravimétrique montre une perte d'oxygène qui correspond effectivement à la formule $\text{Cu}_3\text{Mo}_2\text{O}_{7,5}$. Il n'est cependant pas impossible que ce composé reprenne une certaine quantité d'oxygène pour aboutir à $\text{Cu}_3\text{Mo}_2\text{O}_8$.

Remarque : La phase recuite à 700° conduit à une phase dont le spectre X est identique à celui de $\text{Cu}_3\text{Mo}_2\text{O}_9$ (phase β).

D) CONCLUSION

Nos études ainsi que celles de différents auteurs précisent l'existence d'un certain nombre de phases. Néanmoins de nombreuses incertitudes demeurent. Une étude plus générale du système Mo-Cu-O est à entreprendre.

II - SYSTEME MoO_3 - ZnO

---:---:---:---:---:---:---:---

Le domaine MoO_3 - ZnMoO_4 a été étudié par KUNEV et coll. (3). Ces auteurs signalent un palier eutectique à 707° pour 31,8 moles ZnMoO_4 . Les résultats de ZOBNINA et KILLYAKOV (25)(26) diffèrent des précédents. Ils trouvent en effet un eutectique entre MoO_3 et ZnMoO_4 à 660° pour 8,1 moles de MoO_3 et un composé $3 \text{ ZnO}, \text{MoO}_3$ à fusion non congruente ($t = 1060^\circ$) formant un eutectique avec le molybdate de zinc à 985° pour 49,75 moles MoO_3 %.


Nous avons repris ces études dans un simple but de vérification mais il se trouve que nos résultats présentent quelques différences avec ceux de ZOBNINA et KILLYAKOV.

Le diagramme d'équilibre (fig.2) met en évidence trois paliers d'invariances. Les points caractéristiques sont les suivants :

TABLEAU VI

	: E	: T_1	: T_2
TEMPERATURE ($^\circ\text{C}$)	: 710	: 1000	: 1060
MOLES ZnO %	: 22	: 49	: 51

Fig 2.



Les deux composés cristallisant sont ZnO , MoO_3 et 3 ZnO , 2 MoO_3 . On note également un accident thermique à 950° relatif à 3 ZnO , 2 MoO_3 . Il peut s'agir d'un changement de phase de ce composé.

Dans le domaine MoO_3 , ZnMoO_4 nous retrouvons les mêmes résultats que KUNEV (3). Quant au domaine plus riche en oxyde de zinc nous sommes donc en désaccord avec ZOBNINA et KILLYAKOV (25)(26) qui signalent le composé 3 ZnO , MoO_3 .

Du reste lors du premier échauffement le palier d'invariance T_1 s'arrête dès 60 moles $\text{ZnO} \%$; ce qui correspond bien à $\text{Zn}_3\text{Mo}_2\text{O}_9$. La fin de fusion se situe très approximativement vers 1450° pour 60 moles $\text{ZnO} \%$. Pour des pourcentages plus élevés en ZnO , si cette température n'est pas atteinte, on ne se trouve donc pas dans un état d'équilibre liquide-solide. Dans ce cas, au cours du second échauffement, il y aura apparition de l'invariant de température T_1 qui ne correspondra pas à la composition du mélange initial. Ceci est dû au fait qu'une partie de ZnO n'aura pas réagi. Il se sera formé une phase moins riche à savoir ZnMoO_4 . Ainsi, le solidus, sera constitué de trois phases. Un examen aux rayons X indique du reste la présence des trois phases : ZnMoO_4 ; $\text{Zn}_3\text{Mo}_2\text{O}_9$; ZnO . Un recuit à 850° fait disparaître la phase ZnMoO_4 . Une analyse thermique différentielle réalisée alors, n'indique plus l'invariant correspondant à T_1 . Ainsi dès 50 moles $\text{ZnO} \%$ la température de fusion s'élevant très rapidement, il est donc nécessaire, contrairement à l'habitude, de ne tenir compte que du premier échauffement.

Evidemment cette opération est effectuée sur les produits résultant de la chauffe à 850° pendant 24 h du mélange, en pourcentage choisi, des deux oxydes MoO_3 et ZnO .

Si ces précautions ne sont pas prises, on court le risque, de voir apparaître le palier d'invariance T_1 au delà de 60 moles $\text{ZnO} \%$ ce qui conduirait à établir pour le composé $\text{Zn}_3\text{Mo}_2\text{O}_9$ une autre composition.

REACTION dans l'ETAT SOLIDE

Nous avons étudié la réaction $\text{ZnMoO}_4 + 2 \text{ZnO}$ afin de retrouver le composé $3 \text{ZnO}, \text{MoO}_3$. Un tel mélange chauffé à 850° pendant des durées allant de 1 à 15 jours montre, après examen aux rayons X la présence de l'oxyde de zinc en phase forte. Du reste, dans les mêmes conditions, ZnO apparaît dès que le rapport $\text{ZnO}/\text{MoO}_3 > 3/2$. Il semble donc établi que le composé formé à 850° n'est pas $3 \text{ZnO}, \text{MoO}_3$ mais bien $3 \text{ZnO}, 2 \text{MoO}_3$.


Nous noterons également que le molybdate ZnMoO_4 se forme dès 550° alors que $\text{Zn}_3\text{Mo}_2\text{O}_9$ ne se forme qu'à 850° . Pour des mélanges comprenant des pourcentages en oxyde de zinc supérieurs à 60 moles $\text{ZnO} \%$ et chauffés à 750° il n'apparaît que les phases ZnMoO_4 et ZnO . Il semble donc que la formation de molybdates dits basiques passe par un molybdate ZnMoO_4 comme intermédiaire. Le tableau VII donne quelques résultats concernant l'A.T.D., la nature des phases obtenues dans l'état solide et contrôlées par analyse radiocristallographique.

Le molybdate $\text{Zn}_3\text{Mo}_2\text{O}_9$ est caractérisé par son spectre de rayons X très riche en raies (tableau VIII). Quant au molybdate ZnMoO_4 nous rappellerons la structure triclinique publiée par S. C. ABRAHAMS (13) :

$$Z = 6$$

$a = 9,625 \text{ \AA}$	$= 103,28^\circ$
$b = 6,965 \text{ \AA}$	$= 96,30^\circ$
$c = 8,373 \text{ \AA}$	$= 106,72^\circ$

Fig 3




Dans les mêmes conditions de préparation mais à pH plus acide voisin de 5-6 nous obtenons un précipité dont l'analyse indique qu'il s'agit également du molybdate Ag_2MoO_4 . Par contre le diagramme de diffraction X est différent de celui du molybdate obtenu à pH plus basique. Cette phase obtenue à pH acide (que nous appelons phase α) subit à 280° une transition irréversible sans perte de masse. Le spectre X, après transformation est identique à celui de la phase β . Une analyse thermique différentielle effectuée alors montre une fusion congruente à 560° . Le produit de départ préparé à pH 5-6 est donc une variété cristallographique du molybdate d'argent.

Les raies de diffraction X de la phase α (tableau IX) peuvent s'indicer dans un système quadratique avec :

$$\begin{array}{l} a = 8,63 \text{ \AA} \\ c = 12,0 \text{ \AA} \end{array}$$

La phase β cristallise dans le système cubique (tableau X) $a = 9,322 \text{ \AA}$ paramètre légèrement différent de celui indiqué dans la littérature (29). Nous pouvons résumer les différentes phases de Ag_2MoO_4 par le schéma suivant



Remarque : Ag_2MoO_4 est difficile à obtenir en phase pure. A pH voisin de la neutralité, le précipité obtenu contient presque toujours Ag_2MoO_4 décelable par rayons X.

B - DIAGRAMME d'EQUILIBRE

Les produits de départ sont $\text{Ag}_2\text{MoO}_4 \beta$ et MoO_3 . Le diagramme est difficile à établir car les effets thermiques lors de la cristallisation eutectique ou paritectique conduisent à des pics étalés dans l'échelle des températures. De plus les accidents thermiques sont tous situés entre 480 et 510°.

Trois paliers sont mis en évidence (fig. 4 et 5). Les points caractéristiques sont les suivants :

TABLÉAU XI

	:	T ₁	:	T ₂	:	T
	:		:		:	
TEMPERATURE (°C)	:	510	:	496	:	484
	:		:		:	
Ag_2MoO_4 moles %	:	35	:	52	:	67
	:		:		:	

Les deux composés définis relatifs aux paliers périectiques sont $\text{Ag}_2\text{Mo}_4\text{O}_{13}$ et $\text{Ag}_2\text{Mo}_2\text{O}_7$. Ces compositions sont déterminées par étude des diagrammes de diffraction X. La complexité des thermogrammes ne permet pas en effet d'établir avec certitude les diagrammes de Tamman qui caractérisent la composition des phases cristallisant. La richesse en raies des spectres de

TABLÉAU XIV


-:-:-:-:-

Ag ₂ MoO ₄ (moles %)	TEMPÉRATURE des ACCIDENTS THERMIQUES (°C) en A.T.D.						PHASES en PRÉSENCE
	T _a	E	T _b	T ₂	T ₁	FUSION	
10			490		510	742	MoO ₃ + Ag ₂ Mo ₄ O ₁₃
20			490		510	662	"
25			490		510	616	Ag ₂ Mo ₄ O ₁₃
30			490		510	537	Ag ₂ Mo ₄ O ₁₃ - Ag ₂ Mo ₂ O ₇
33,3			490		510	520	"
35	480		490	496	510		"
40	480		490	496		502	"
45	480			496		500	"
50	480			496		(498)	Ag ₂ Mo ₂ O ₇
52	480			496			"
55	480					494	Ag ₂ Mo ₂ O ₇ + Ag ₂ MoO ₄
60	480	484				490	"
65	480	484					"
70		484				495	"
80		484				526	"
90		484				542	"
100						560	Ag ₂ MoO ₄

T_a : Transformation de Ag₂Mo₂O₇

T_b : " " Ag₂Mo₄O₁₃

Fig 4




550°

525°

500°

475°



Fig 5



diffraction X de ces deux composés (phases basses températures) tableau XII et XIII et leurs distances inter-réticulaires très proches fait que la précision sur la détermination de la composition de ces deux phases n'est pas très grande (3 à 5 % en moles Ag_2MoO_4 sur le diagramme). Néanmoins nous pouvons affirmer que pour la composition 3 MoO_3 - Ag_2MoO_4 nous avons les deux phases en présence et que le spectre est uniquement composé par l'ensemble des raies des spectres de $\text{Ag}_2\text{Mo}_4\text{O}_{13}$ et $\text{Ag}_2\text{Mo}_2\text{O}_7$. Ces deux composés subissent des transitions de phases ; le premier à 490° , le second à 480° .

C - REACTION dans l'ETAT SOLIDE

L'obtention de ces produits se fait par voie sèche suivant les réactions



Ces réactions sont longues car on ne peut pas dépasser 450° .

Le tableau XIV donne certains résultats obtenus par A.T.D. (le diagramme a été établi en opérant tous les 1 % avec deux ou trois essais pour chacune des concentrations) et les domaines de phases identifiés aux rayons X sur les produits préparés à l'état solide.

Remarque : CAILLET (31) étudiant le système $\text{MoO}_3 - \text{Na}_2\text{MoO}_4$ n'identifie que les deux molybdates : $\text{Na}_2\text{Mo}_4\text{O}_{13}$ et $\text{Na}_2\text{Mo}_2\text{O}_7$. Une composition analogue se retrouve donc quant aux sels d'argent. Il faut néanmoins rappeler que les molybdates du type $\text{M}_2\text{Mo}_3\text{O}_{10}$ ont été signalés par HOERMANN (32) en 1928 qui ne les a d'ailleurs pas identifiés par radiocristallographie.

Le tableau XV résume quelques résultats :

TABLEAU XV

M = Li, Na, K		Composés signalés par HOERMANN (32)	Composés signalés par CAILLET (31)
Li	$\text{Li}_2\text{Mo}_4\text{O}_{13}$	fusion incongruente	
	$\text{Li}_2\text{Mo}_3\text{O}_{10}$	"	
	$\text{Li}_2\text{Mo}_2\text{O}_7$	"	
Na	$\text{Na}_2\text{Mo}_4\text{O}_{13}$	fusion incongruente	$\text{Na}_2\text{Mo}_4\text{O}_{13}$
	$\text{Na}_2\text{Mo}_3\text{O}_{10}$	"	
	$\text{Na}_2\text{Mo}_2\text{O}_7$	fusion congruente	$\text{Na}_2\text{Mo}_2\text{O}_7$
K	$\text{K}_2\text{Mo}_3\text{O}_{10}$	fusion congruente	$\text{K}_2\text{Mo}_4\text{O}_{13}$
			$\text{K}_2\text{Mo}_3\text{O}_{10}$
			$\text{K}_2\text{Mo}_2\text{O}_7$

Les composés de la forme $M_2Mo_3O_{10}$ sont stables si
 $M = K, Rb, Cs$. GATEHOUSE (33) a déterminé la structure
 de $K_2Mo_3O_{10}$:

Système monoclinique groupe spatial $C_{2/c}$ = $98^{\circ}50'$

$$\begin{aligned} a &= 13,902 \overset{\circ}{\text{Å}} \\ b &= 7,914 \overset{\circ}{\text{Å}} \\ c &= 8,845 \overset{\circ}{\text{Å}} \end{aligned}$$

Il a montré que les entourages du molybdène
 étaient de deux types : octaèdre de MoO_6 déformés et
 pyramide à base carrée MoO_5 ayant en commun des côtés
 pour former des chaînes infinies parallèle à l'axe C.
 C'est la première fois qu'un entourage à cinq coordinats
 pour le molybdène (VI) est trouvé d'une manière irréfutable.

En effet dans les types $M_2^I MoO_4$ on trouve des
 groupes tétraédriques MoO_4 (Na_2MoO_4 , Na_2WO_4 , Ag_2MoO_4
 sont des spinelles, Li_2MoO_4 a une structure phénacite)
 (35)(36)(37)(38) alors que dans $Na_2Mo_2O_7$ (système
 orthorhombique) existe des groupes infinis d'ion $Mo_2O_7^{2-}$
 formés par des tétraèdres MoO_4 ayant deux oxygènes en
 commun avec une chaîne d'octaèdres MoO_6 (39)(40).

Les molybdates de Rubidium et de Caesium
 $Rb_2Mo_3O_{10}$ et $Cs_2Mo_3O_{10}$ sont isotypes de $K_2Mo_3O_{10}$.

GATEHOUSE et Coll. (33) pensent que pour le
 cas du Lithium et du Sodium les phases $Li_2Mo_3O_{10}$ et
 $Na_2Mo_3O_{10}$ si elles existent, ce qui est contesté (31),
 étant à fusion incongruente ne forment pas de composé
 cristallin stable.

Ils émettent l'hypothèse que la stabilité pour de tels composés apparaît pour une certaine taille de rayon ionique se situant entre le Sodium et le Potassium (0,95 - 1,33 Å selon PAULING pour un coordina^ot à six) et que le rayon ionique de Ag⁺ étant égal à 1,26 Å le composé Ag₂Mo₃O₁₀^o existe.

Ceci est en fait en désaccord avec ce que nous avons trouvé mais une publication ultérieure de GATEHOUSE (34) sur ce présumé composé lui attribue une composition différente : Ag₆Mo₁₀C₃₃^o (dans le système MoO₃ - Ag₂MoO₄ = 30 % Ag₂MoO₄) et une structure différente de celle des molybdates alcalins M₂Mo₃O₁₀ (M = K, Rb, Cs) qui est la suivante :

système triclinique Groupe Spatial P₁ Z = 1

a = 7,59 Å ^o	α = 82,6°
b = 8,38 Å ^o	β = 102,9°
c = 11,42 Å ^o	γ = 106,4°

La différence vient de ce que l'argent n'étant pas un véritable métal alcalin d'autres facteurs que le rayon ionique interviennent dans la formation des composés et la nature de leur structure.

De plus l'examen du diagramme montre que les composés de l'argent comme ceux du Lithium ou du Sodium sont à fusion incongruente ce qui pose des problèmes pour l'obtention de monocristaux. Pensant que le "composé" Ag₂Mo₃O₁₀^o était à fusion congruente comme pour celui

au Potassium. GATEHOUSE et Coll. (33) ont porté à fusion un mélange de Ag_2MoO_4 et MoO_3 dans le rapport 1 : 2. Ils étaient en réalité bien placés pour obtenir des monocristaux de la phase $\text{Ag}_2\text{Mo}_4\text{O}_{13}$ ou bien de la limite d'une solution solide autour de cette composition ; limite répondant à la formule globale $\text{Ag}_6\text{Mo}_{10}\text{O}_{33}$ du côté de la partie riche en Ag_2MoO_4 ; ce qui est très vraisemblable car il suffit d'admettre un domaine correspondant à 5 % en moles de Ag_2MoO_4 .

V - SYSTEME WO_3 - Ag_2WO_4
-:-:-:-:-:-:-:-

Comme pour le système précédent l'instabilité de l'oxyde d'argent nous a contraint à limiter notre étude à la même partie du diagramme. Le tungstate d'argent est préparé comme précédemment pour le molybdate mais à pH plus acide nous n'avons pas mis en évidence une variété cristallographique différente comme c'est le cas pour Ag_2MoO_4 .

A - DIAGRAMME d'EQUILIBRE

Le diagramme thermique est tracé par A.T.D. à l'échauffement à partir des mixtes ayant préalablement réagi par chauffage à 650° pendant 48 h. Comme pour le système MoO_3 - ZnO nous n'avons pu tenir compte que des résultats fournis par les premiers chauffages sur ces échantillons car les équilibres correspondant aux paliers péritectiques sont toujours très partiellement irréversibles au cours du refroidissement. Il y a donc apparition d'accidents ne correspondant pas à la concentration initiale. Un recuit ne donne pas de très bons résultats car on ne peut pas sortir le mixte déjà fondu du crouset pour le rebroyer et le recuire. La non réversibilité pour les équilibres dans ce système est beaucoup plus marquée que celle observée pour MoO_3 - Ag_2MoO_4 ce qui a compliqué d'autant

la tâche. Par contre les paliers sont plus espacés dans l'échelle des températures. Trois paliers sont mis en évidence (fig.6).

Les points caractéristiques sont les suivants :

TABLEAU XVI

	T ₁	T ₂	E
TEMPERATURE (°C)	720	686	590
Ag ₂ WO ₄ moles %	56	60	85

Les deux composés définis relatifs aux paliers péritectiques sont Ag₂W₄O₁₃ et Ag₂W₂O₇. Ce système est analogue au système MoO₃ - Ag₂MoO₄ mais ne manifeste aucune transformation allotropique. Dans ce cas aussi la richesse en raies des spectres de diffraction X de ces deux composés (tableaux XVII, XVIII) ne permet pas de déterminer avec plus de précision la composition des deux phases mais l'écart plus important dans l'échelle des températures est un aide précieux car on peut noter (tableau XIX) qu'à 27,5 moles Ag₂WO₄ % un pic relatif à T₂ est apparu ce qui permet de penser qu'une des phases est bien Ag₂W₄O₁₃ ce qui n'a pu être affirmé aussi nettement pour Ag₂Mo₄O₁₃.


En ce qui concerne Ag₂W₂O₇ la précision est moindre puisque le pic correspondant à l'eutectique n'apparaît qu'à 60 % de Ag₂WO₄.

TABLERAU XIX

-:-:-:-:-

$\text{Ag}_2 \text{W}_4 \text{O}_{13}$ (moles %)	TEMPERATURE des ACCIDENTS THERMIQUES (°C) par A.T.D.				PHASES en PRESENCE
	E	T ₂	T ₁	FUSION	
12,5			720		$\text{W}_2 \text{O}_3 + \text{Ag}_2 \text{W}_4 \text{O}_{13}$
15			720		"
20			720	1000	"
25			720	970	$\text{Ag}_2 \text{W}_4 \text{O}_{13}$
27,5		686	720	946	"
30		686	720	928	$\text{Ag}_2 \text{W}_4 \text{O}_{13} + \text{Ag}_2 \text{W}_2 \text{O}_7$
35		686	720	900	"
40		686	720	858	"
45		686	720	817	"
50		686	720	780	$\text{Ag}_2 \text{W}_2 \text{O}_7$
60	590	686		700	$\text{Ag}_2 \text{W}_2 \text{O}_7 + \text{Ag}_2 \text{W}_4 \text{O}_{13}$
70	590			648	"
80	590			610	"
85	590				"
90	590			600	"
100				610	$\text{Ag}_2 \text{W}_4 \text{O}_{13}$

Fig 6





Nous n'avons pas tracé les diagrammes de TAMM, car les équilibres n'étant pas entièrement réversibles, il aurait fallu opérer par A.T.S. avec de longs recuits.

Les composés formés sont identiques, quant à leur composition à ceux trouvés par HOERMANN(32) en ce qui concerne les binaires $\text{Li}_2\text{WO}_4 - \text{WO}_3$ et $\text{Na}_2\text{WO}_4 - \text{WO}_3$ qui ne trouve un composé $\text{M}_2^{\text{I}}\text{W}_3\text{O}_{10}$ que pour le Potassium. Les aspects des diagrammes sont d'ailleurs très analogues. CAILLET (31) met aussi en évidence dans le système $\text{Na}_2\text{WO}_4 - \text{WO}_3$ les deux mêmes composés (di et tétramolybdate).

B - REACTION dans L'ETAT SOLIDE

Les deux composés sont préparés suivant la méthode générale. La réaction est totale à 650° après 48 h de chauffage.



Le tableau XIX résume les résultats obtenus pour différentes concentrations par analyse radiocristallographique.

VI - SYSTEME WO_3 - CuO

-:-:-:-:-:-:-:-

Les études concernant les tungstates des différents métaux ont été extrêmement nombreuses en raison de leurs propriétés physiques très intéressantes (47)(52). En effet de nombreux tungstates donnent naissance à des structures pérovskites qui ont été étudiées tant du point de vue électrique que magnétique (41)(44)(46)(49)(50)(51)(53)(54).

Les tungstates forment aussi facilement des bronzes et avec le Cuivre de nombreuses phases furent obtenues (43)(45)(48)(55). Néanmoins il n'était nulle part fait mention de composé autre que CuWO_4 dans le système WO_3 - CuO .

Voulant savoir s'il y avait analogie avec le système MoO_3 - CuO nous avons entrepris l'étude de ce système en opérant uniquement dans l'état solide. Diverses concentrations ont été chauffées à des températures allant de 800 à 850° pendant des durées de 24 à 72 h. A ces températures il n'y a aucune décomposition de CuO ce qui a été vérifié par thermogravimétrie et les réactions sont complètes. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau XX.

TABLEAU AA

CuO (moles %)	PHASES en PRESENCE	CuO (moles %)	PHASES en PRESENCE
0	WO ₃	55	CuWO ₄ + Cu ₃ WO ₆
3	WO ₃ - CuWO ₄	60	"
10	"	70	"
20	"	75	Cu ₃ WO ₆
30	"	80	Cu ₃ WO ₆ + CuO
40	"	90	"
50	CuWO ₄	100	CuO

En plus du composé CuWO₄ qui est bien connu (42) et qui a la structure suivante :

Système monoclinique

$$\begin{aligned}
 a &= 4,55 \text{ \AA} \\
 b &= 4,88 \text{ \AA} \\
 c &= 5,82 \text{ \AA} \\
 \beta &= 88^\circ
 \end{aligned}$$

on a trouvé un autre composé répondant à la formule Cu₃WO₆. Le spectre de diffraction X est riche en raies et les distances interréticulaires sont données dans le tableau XXI. Cette composition était prévisible car pour de nombreux autres métaux divalents cette phase existe (41). Les structures selon la nature de l'ion divalent, ou du couple, car de nombreux composés répondent à cette formule, sont du type pérovskite ou du type (NH₄)₃FeF₆.

TABLEAU XXI






- - - - -

Cu ₃ W C ₆					
d _{mes} (Å)	:	I/I ₀	:	d _{mes} (Å)	:
5,682	:	40	:	1,886	:
4,924	:	7	:	1,821	:
4,414	:	60	:	1,790	:
4,012	:	12	:	1,731	:
3,463	:	4	:	1,657	:
3,276	:	2	:	1,633	:
3,110	:	1	:	1,611	:
2,957	:	14	:	1,590	:
2,720	:	100	:	1,550	:
2,623	:	86	:	1,530	:
2,453	:	35	:	1,460	:
2,384	:	6	:	1,445	:
2,322	:	38	:	1,404	:
2,191	:	10	:	1,372	:
2,140	:	4	:	1,359	:
2,090	:	16	:	1,346	:
1,959	:	2	:	1,335	:
1,928	:	1	:		:

TABLEAU XXII

—:—:—:—:—

N° de la PREPARATION	CuO	WO ₃	MoO ₃	PHASES en PRESENCE
1	10	10	80	F
2	15	5	80	F
3	20	20	60	F
4	30	10	60	A + F
5	25	25	50	F + (D)
6	37,5	12,5	50	A + F
7	10	45	45	F + D
8	20	40	40	F + D
9	33,3	33,3	33,3	F + D
10	45	15	40	D
12	25	50	25	F + D
14	20	60	20	F + D
17	10	80	10	F + D
18	30	60	10	F + D
19	40	50	10	F + D
20	45	45	10	F + D
23	50	16,7	33,3	D
24	50	25	25	D
25	50	33,3	16,7	D
11	52,5	17,5	30	D + (B+E)
13	55	22,5	22,5	D + (B+E)
15	66,5	16,75	16,75	(D) + B+E
16	69,5	15,25	15,25	B + E
21	67,5	22,5	10	B + E
22	80	10	10	B + E + C






Fig 7

B - SYSTEME CuMoO_4 - CuWO_4 (ligne A.D)

De 33,3 à 100 % en CuWO_4 seul son spectre apparaît. Nous n'observons pas de déplacement des raies, mais il s'agit très certainement d'une solution solide.

C - SYSTEME MoO_3 - WO_3 - $x\text{CuO}$

1) $x \leq 0,5$ (partie MADW)

Les deux phases CuWO_4 et $(\text{Mo}_{1-x}\text{W}_x)\text{O}_3$ ont une présence dominante dans cette partie car CuMoO_4 n'apparaît qu'au voisinage du segment MA.

2) $0,5 \leq x \leq 1$



On retrouve 3 CuO , WO_3 et la phase β en présence de CuWO_4 ou CuO selon que l'on se trouve entre les lignes AD et BE ou dans le triangle CBE.

Pour délimiter parfaitement les domaines d'existence une étude très détaillée est nécessaire mais nous n'en avons pas fait l'objet de notre recherche.

CHAPITRE II

-:-:-:-

ETUDE des PHASES



et de quelques substitutions

B - CONDITIONS de PREPARATION. DOMAINE d'EXISTENCE

Des principaux essais concernant l'étude des domaines d'existence ont eu lieu avec les composés du Lanthane car il est le seul à réunir les deux conditions suivantes : il donne toute la gamme des composés et leurs spectres de diffraction (avec $\text{Cu K}\alpha_1$) sont très lisibles.

a) Cd Mo O_4 - - - -

Avec Cd Mo O_4 on obtient une phase pure par chauffage pendant 24 h à 950° d'un mélange $\text{Ln}_2 \text{ Mo O}_6$ / Cd Mo O_4 dans le rapport 2/1 ($\text{Ln} = \text{La} \rightarrow \text{Yb}, \text{Y}$). La composition est très stricte car si l'on s'écarte de 1 % seulement la phase en excès est décelable aux rayons X. Pour être plus précis disons que la phase pure pour le Lanthane est obtenue avec $66,7\% \leq \text{La}_2 \text{ Mo O}_6 \leq 68\%$ alors qu'avec Er, Tm, Yb, Y il faut $\text{Ln}_2 \text{ Mo O}_6 = 66\%$.

La différence est très faible mais pour l'examen des spectres de rayons X et surtout l'étude des raies très faibles il est nécessaire de se placer dans ces conditions en pourcentage pour avoir des phases pures. Toutefois nous ne ferons par la suite aucune différence entre ces différents composés auxquels nous attribuerons la formule moléculaire $\text{Cd Ln}_4 \text{ Mo}_3 \text{ O}_{16}$

Nous n'avons pas obtenu de composés avec $\text{Lu}_2 \text{ Mo O}_6$.

b) Ca Mo O_4 - - - -


Avec ce molybdate les phases fluorines sont obtenues pures dans un domaine de concentration différent de celui qui précède à

savoir : $70 \% \leq \text{Ln}_2 \text{MoO}_6 \leq 75 \%$. Seuls La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd donnent des composés avec CaMoO_4 . La température nécessaire à la réaction est plus élevée que dans le cas du Cadmium. En effet pour le composé au Lanthane elle est de 1250° pendant 3 jours et de 1350° pendant 3 jours pour celui au Gadolinium. La température est très importante car il faut franchir un seuil élevé pour qu'il y ait réaction mais ne pas dépasser cette température de plus de 50° sans quoi les pastilles obtenues présentent une couleur brune signe d'un début de décomposition.

Comme tous les composés étudiés dans cette série sont préparés dans le rapport $3 \text{Ln}_2 \text{MoO}_6 / \text{CaMoO}_4$ nous leur attribuons toujours la formule moléculaire globale : $\text{CaLn}_6\text{Mo}_4\text{O}_{22}$.



Le domaine d'existence de la phase obtenue et la température de préparation sont identiques à ceux de CaMoO_4 . Le nombre de composés est un peu plus restreint puisqu'il n'en existe pas avec le Gadolinium.



La phase fluorine s'obtient pure des pourcentages en $\text{La}_2 \text{MoO}_6$ compris entre 66 et 75 %. La réaction a lieu par chauffage à 950° pendant 24 h. Il semble que dans le cas du plomb le domaine d'existence soit plus étendu que pour les autres cations. Le nombre de composés obtenus est égal à ceux préparés avec le Strontium.

Les essais avec d'autres molybdates tels ceux de Nickel, Cuivre Zinc et Baryum se sont révélés négatifs. Par contre si l'on prend des

tungstates comme ceux de Calcium, Strontium et Plomb on obtient dans les mêmes conditions que précédemment suivant l'ion M^{2+} des phases cubiques type fluorine.

C - CONCLUSION

Une constatation importante apparait dès maintenant : pour qu'il y ait formation d'une phase type $Ca F_2$ entre les molybdates de terres rares, dont nous reparlerons de la structure (57)(58) par la suite, et les molybdates ou tungstates $M Mo O_4$ ou $M W O_4$ dans les conditions décrites ci-dessus il faut que ceux-ci soient du type Scheelite. En effet les molybdates de Ni, Cu, Zn, ne sont pas du type Scheelite et ne réagissent pas. Alors que $Cd Mo O_4$ donnent des composés avec tous les molybdates $Ln_2 Mo O_6$ (sauf pour Lu) $Cd W O_4$ lui n'en donne pas car sa structure est monoclinique. Les tungstates de Ca, Sr, Pb étant eux du type Scheelite donnent des composés. En ce qui concerne $Ba Mo O_4$ et $Ba W O_4$ pourtant du type Scheelite nous n'avons pas pu obtenir de composé pour une autre raison : Ba^{2+} est un ion trop volumineux pour les sites.

II - SUBSTITUTIONS

--:--:--:--

A - INTRODUCTION

Le remplacement de la phase Scheelite $M Mo O_4$ par $(M'_{0,5} Ln_{0,5}) M'' O_4$ où :

$M' = Li, Na, K$

$M'' = Mo, W$

est possible à condition que cette phase soit du type Scheelite ce qui a déjà été très étudié (4)(5)(61)(62)(63). Si l'on prend le composé type $(Na_{0,5} Ln_{0,5}) Mo O_4$ on obtient des composés que pour $(Ln = Gd \longrightarrow Lu, Y)$ avec $La_2 Mo O_6$, $Pr_2 Mo O_6$ et $Nd_2 Mo O_6$. Nous ne développerons pas plus les résultats obtenus car ils font partie d'un travail actuellement en cours (60).

B - SYSTEMES $M'F-Ln_2 O_3-Mo C_3$ ($M' = Li, Na, K$)

La réaction entre $Ln_2 Mo O_6$, et $M'F$ et $Mo C_3$ conduit également à une phase fluorine. Par rapport aux premiers systèmes l'oxyde $M O$ est donc remplacé par un fluorure $M'F$.

Conditions de Préparation - Domaine d'existence

Les phases $M'Ln_4 Mo_3 O_{15} F$ ont été préparées suivant la proportion $M'F + Mo C_3 + 2 Ln_2 Mo O_6$ qui est celle des composés type

Cd $\text{La}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$. Les phases sont obtenues pures par chauffage entre 700° et 900° sous azote sec ou entre 700° et 800° sous vide sauf pour le Praséodyme où l'on doit opérer sous vide sans que la température dépasse 700° (Tableau XXIII). Aucune perte de masse n'a été constatée.

Nous n'avons pas obtenus de produits avec le Samarium alors qu'avec l'Europium seuls Li F et Na F réagissent.

C - CONCLUSION

Jusqu'à présent la phase réagissant avec Ln_2MoO_6 devait être du type Scheelite. Dans le cas des fluorures on peut donc supposer l'existence d'une phase intermédiaire de formule $\text{Ln}'\text{MoO}_3\text{F}$ et de structure type Scheelite. Une étude plus approfondie reste à entreprendre.

TABLEAU XXIII

COMPOSE FORMULE MOLECULAIRE	TEMPERATURE de PREPARATION DUREE	COULEUR	PARAMETRE a(A) de la MAILLE OCTUPLE	REMARQUES
2+ Z = 4				
La ₄ Mo ₃ O ₁₆	950° - 24 h	gris - blanc	11,114	
Ce ₄ Mo ₃ O ₁₆	900° - 24 h	noir	11,070	Le Cérium est sous
Pr ₄ Mo ₃ O ₁₆	1000° - 12 h	jaune - clair	11,031	forme de Ce ⁴⁺
Nd ₄ Mo ₃ O ₁₆	950° - 24 h	bleu - clair	10,96	
Sm ₄ Mo ₃ O ₁₆	950° - 24 h	jaune - clair	10,894	
Eu ₄ Mo ₃ O ₁₆	950° - 48 h	crème	10,85	Le produit est très
Gd ₄ Mo ₃ O ₁₆	1000° - 48 h	blanc	10,835	mal cristallisé
Tb ₄ Mo ₃ O ₁₆	950° - 12 h	vert - sombre	10,788	Préparé en ampoule
Dy ₄ Mo ₃ O ₁₆	1000° - 24 h	crème	10,746	sallée
Ho ₄ Mo ₃ O ₁₆	950° - 60 h	gris - crème	10,726	
Er ₄ Mo ₃ O ₁₆	950° - 60 h	rose	10,690	
Tm ₄ Mo ₃ O ₁₆	1000° - 24 h	jaune - vert Très pâle	10,650	Ce produit possède une cristallisation excellente
Yb ₄ Mo ₃ O ₁₆	1000° - 24 h	crème - pâle	10,624	
Y ₄ Mo ₃ O ₁₆	950° - 72 h	blanc	10,716	
3+ Z = 2,91				
La ₆ Mo ₄ O ₂₂	1250° - 48 h	crème	11,21	
La ₆ Mo ₃ W O ₂₂	1250° - 48 h	crème	11,22	
Pr ₆ Mo ₄ O ₂₂	1300° - 18 h	jaune - orangé	11,08	
Nd ₆ Mo ₄ O ₂₂	1250° - 48 h	bleu	11,003	
Nd ₆ Mo ₃ W O ₂₂	1250° - 48 h	jaune	11,008	
Sm ₆ Mo ₄ O ₂₂	1300° - 48 h	jaune	10,916	
Gd ₆ Mo ₄ O ₂₂	1350° - 24 h	jaune	10,842	
Gd ₆ Mo ₃ W O ₂₂	1350° - 24 h	jaune	10,845	
Eu ₆ Mo ₄ O ₂₂	1300° - 48 h	jaune	10,76 - 10,78	Les produits avec
Eu ₆ Mo ₃ W O ₂₂	1300° - 48 h	jaune	10,79 - 10,80	l'Europium ont été
				obtenus mais la
				très mauvaise cris-
				tallisation ne per-
				met pas de proposer
				un paramètre très précis.

TABLEAU XXIII (suite)

COMPOSE FORMULE MOLECULAIRE	TEMPERATURE de PREPARATION DUREE	COULEUR	PARAMETRE a(A) de la MAILLE OCTUPLE	REMARQUES
2+ Z = 2,91				
La ₆ Mo ₄ O ₂₂	1250° - 48 h	jaune	11,26	
La ₆ Mo ₃ W O ₂₂	1250° - 48 h	jaune	11,29	
Pr ₆ Mo ₄ O ₂₂	1300° - 18 h	jaune - orangé	11,11	
Nd ₆ Mo ₄ O ₂₂	1300° - 48 h	bleu - violet	11,048	
Nd ₆ Mo ₃ W O ₂₂	1300° - 48 h	bleu - violet	11,044	
Sm ₆ Mo ₄ O ₂₂	1300° - 48 h	jaune	10,950	
Eu ₆ Mo ₄ O ₂₂	{ 1200° - 40 h 1350° - 24 h	jaune	10,78 - 10,80	Ces 2 produits n'ont pas pu être obtenus en phase très pure. Leur paramètre est iden- tique à celui des produits au calcium
Eu ₆ Mo ₃ W O ₂₂	{ 1200° - 40 h 1350° - 24 h	jaune	10,78 - 10,80	
2+ Z = 4				
La ₄ Mo ₃ O ₁₆	950° - 24 h	jaune - vif	11,291	
Pr ₄ Mo ₃ O ₁₆	950° - 24 h	jaune - vif	11,14	
Nd ₄ Mo ₃ O ₁₆	950° - 24 h	vert	11,090	
Sm ₄ Mo ₃ O ₁₆	950° - 60 h	jaune - vif	11,018	
Eu ₄ Mo ₃ O ₁₆	950° - 60 h	jaune - vif	10,83	
Eu ₄ Mo ₂ W O ₁₆	1000° - 12 h	jaune - vif	10,79 - 10,80	
3+ Y ³⁺ Z = 2,91				
(0,5Y _{0,5})La ₆ Mo ₄ O ₂₂	{ 1080° - 72 h 1130° - 24 h	blanc	11,216	Ces composés font partie d'une série importante (60)
(0,5Y _{0,5})La ₆ Mo ₃ WO ₂₂	{ 1080° - 72 h 1170° - 48 h	blanc	11,204	

TABLEAU XXIII (suite)

COMPOSE	TEMPERATURE de	COULEUR	PARAMETRE a(Å):	REMARQUES
FORMULE MOLECULAIRE	PREPARATION		de la	
	DUREE		MAILLE OCTUPLE:	
F Z = 4				
i La ₄ Mo ₃ O ₁₅ F	700° - 24 h	blanc	11,246	Sous azote
i Pr ₄ Mo ₃ O ₁₅ F	{ 600° - 16 h			
	700° - 4 h	jaune - pâle	11,086	Sous vide
i Nd ₄ Mo ₃ O ₁₅ F	{ 600° - 4 h			
	700° - 20 h	bleu - violet	11,05	Sous azote
i Eu ₄ Mo ₃ O ₁₅ F	{ 600° - 4 h			
	700° - 20 h	blanc	10,98	Sous azote
F Z = 4				
a La ₄ Mo ₃ O ₁₅ F	{ 700° - 48 h	blanc	11,27}	Sous azote
	900° - 24 h	blanc	11,32}	
a Pr ₄ Mo ₃ O ₁₅ F	{ 600° - 4 h			
	700° - 14 h	jaune	11,09	Sous vide
a Nd ₄ Mo ₃ O ₁₅ F	{ 700° - 48 h			
	900° - 24 h	bleu - violet	11,032}	Sous azote
a Eu ₄ Mo ₃ O ₁₅ F	700° - 48 h	blanc - crème	11,09 }	Sous azote
			10,903	
F Z = 4				
La ₄ Mo ₃ O ₁₅ F	{ 500° - 24 h			
	800° - 4 h	blanc	11,333	Sous azote
Pr ₄ Mo ₃ O ₁₅ F	{ 600° - 12 h			
	700° - 8 h	vert - sombre	11,17	Sous vide
Nd ₄ Mo ₃ O ₁₅ F	{ 500° - 24 h			
	800° - 6 h	bleu	11,105	Sous azote

III - COMPOSES du CERIUM

A - PREPARATION de $Ce_2 Mo O_6$

Le degré stable du Cérium est le degré IV et il est bien connu que l'ion Ce^{3+} est un réducteur puissant. Nous avons effectué deux préparations en ampoules scellées sous vide à partir des deux mélanges différents suivants : $2 Ce O_2 - Mo O_2$ et $Ce_2 O_3 - Mo O_3$; afin d'obtenir le molybdate $Ce_2 Mo O_6$. Ces mélanges ont été chauffés de 600° à 1000° pendant 24 h. Les deux produits obtenus sont identiques et présentent un spectre de rayons X analogue à ceux des phases fluorines.

Dans le cas du mélange $Ce_2 O_3 - Mo O_3$ le Cérium Ce^{3+} a réduit Mo^{6+} suivant la réaction



car sans rebroyage et après une heure de réaction nous constatons que les réactions ne sont pas totales, les spectres de rayons X montrent pour les deux mélanges d'ailleurs, qu'en plus de la phase fluorine il existe $Mo O_2$ et $Ce O_2$ facilement identifiables mais pas $Ce_2 O_3$ ou $Mo O_3$. Ainsi, le Cérium III réduit le molybdène VI avant de former $Ce_2 Mo O_6$. Un rebroyage et un nouveau chauffage sous vide pendant quelques heures à $1000^\circ C$ fait disparaître $Mo O_2$ et $Ce O_2$ en excès.

Le molybdate obtenu se présente sous la forme d'une poudre noire brillante à aspect métallique. Nous l'avons comme pour le cas

des autres molybdates de lanthanides chauffé avec Cd Mo O_4 dans le rapport 2/1 sous vide à 1000°C . Nous avons obtenu un composé ayant le même aspect que $\text{Ce}_2\text{Mo O}_6$ et un spectre de diffraction X très semblable mais avec un paramètre différent. Avec Pb Mo O_4 nous n'avons pas eu de réaction.

Ainsi nous avons trois composés Ce O_2 , $\text{Ce}_2\text{Mo O}_6$ et $\text{Cd Ce}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$ qui cristallisent tous dans le système cubique avec une structure du type fluorine ou tout au moins directement dérivée puisque les spectres X des deux derniers présentent des raies de surstructure ce qui conduit à prendre un paramètre double (ces raies de surstructure ont des intensités qui varient de $\text{Ce}_2\text{Mo O}_6$ à $\text{Cd Ce}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$).

Les paramètres sont donnés à titre comparatif dans le tableau XXIV

TABEAU XXIV

	Ce O_2	$\text{Ce}_2\text{Mo O}_6$	$\text{Cd Ce}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$
$a (\text{\AA})$	5,411	11,12	11,07

Le paramètre diminue entre $Ce_2 Mo O_6$ et $Cd Ce_{1/4} Mo_3 O_{16}$ ceci parce que le rapport : nombre de cations volumineux / nombre de cations moins volumineux est plus important pour le premier. Ce raisonnement n'est pas applicable au passage de $Ce O_2$ à $Ce_2 Mo O_6$ car pour le premier composé il n'y a qu'une sorte de cation et que l'introduction d'un second cation très différent du point de vue taille, même plus petit exige un réarrangement qui peut conduire à une dilatation de la maille.

B - CONCLUSION

Le produit $Cd Ce_{1/4} Mo_3 O_{16}$ demande une étude plus approfondie que nous entreprendrons car si dans $Ce_2 Mo O_6$ le molybdène est au degré IV dans $Cd Mo O_4$ il est au degré VI; aussi le produit obtenu doit avoir des propriétés électriques et magnétiques intéressantes.

PARTIE II - ETUDE STRUCTURALE

I - INTRODUCTION

-:-:-:-

Les spectres de rayons X obtenus pour ces phases sont identiques entre eux et sont composés par :

- des raies principales tout à fait comparables à celles des spectres X de composés du type fluorine tels Mg F_2 ou Pb F_2 tant en ce qui concerne l'ordre de grandeur des distances inter-réticulaires que la valeur des rapports d'intensités I/I_c .

- des raies secondaires d'intensités inférieures à 5 que nous appellerons raies de surstructure et qui n'appartiennent pas au type Fluorine (groupe spatial $\text{Fm}\bar{3}\text{m}$).

Dans une phase fluorine idéale tous les cations sont dans des sites équivalents (sites 4a) à entourage cubique d'anions qui eux sont tous dans les sites (8c). La distance anion-cation dans nos composés, si l'on considère que nous avons une structure fluorine idéale, avec distribution statistique des cations dans les sites 4a, est égale à $\frac{a\sqrt{3}}{4}$ et elle varie de 2,30 Å (pour $\text{Cd Yb}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$) à 2,45 Å ($\text{Pb La}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$).

Cette distance stricte pour un composé donné n'est pas compatible avec les distances $\text{M} - \text{O}$, $\text{Ln} - \text{O}$, $\text{Mo} - \text{O}$ déterminées



pour un grand nombre de composés et parfaitement connues suivant la coordinance du cation.

En particulier les rayons ioniques de Mo^{6+} et La^{3+} par exemple sont beaucoup trop différents (0,62 et 1,14 Å selon AHRBIS pour un coordinat de Six) pour penser qu'ils soient dans des sites équivalents.

De plus l'existence des raies de surstructure implique soit un classement, soit un déplacement d'ions par rapport aux positions dans la fluorine, soit les deux.

Toutes ces phases sont à fusion incongruente et leurs températures de décomposition (t_D) ainsi que leurs températures de fusion (t_F) sont très élevées (pour les produits au Cadmium $\begin{cases} t_D & 1200^\circ \\ t_F & 1450^\circ \end{cases}$ pour les produits au Calcium $t_D \sim 1400^\circ - 1450^\circ$) ce qui ne nous a pas permis d'obtenir de monocristaux. En effet nous n'avons pas pour l'instant les moyens techniques nécessaires à l'étude du système ternaire $\text{M O} - \text{Mo O}_3 - \text{Ln}_2 \text{O}_3$ dont la connaissance du domaine ($\text{M O} - 3 \text{ Mo O}_3 - 2 \text{ Ln}_2 \text{O}_3$) permettrait de se placer dans les meilleures conditions pour l'obtention de monocristaux.

Nous avons néanmoins essayé d'en obtenir par refroidissement lent d'un mélange fondu, par grossissement de grains (chauffage à 1100° pendant 1 mois) et par coprécipitation mais nos efforts furent vains.

Ainsi l'étude structurale que nous nous proposons d'entreprendre a du faire appel à d'autres techniques : magnétochimie, étude



du spectre optique de l'ion activateur Eu^{3+} dans un certain nombre de nos composés, spectroscopie Infra-Rouge afin d'essayer de connaître la symétrie des sites occupés par les différents cations. Nous avons l'espoir que l'apport de ces différentes techniques combiné à un examen attentif de quelques excellents spectres obtenus avec des poudres permettraient de mieux préciser la véritable structure cristalline de nos phases que nous continuerons néanmoins à appeler phases "fluorine" dans la suite de notre exposé.



II - "TUD" des PARAMETRES - DETERMINATION du NOMBRE Z

---:---:---:---:---:---:---:---:---:---

A - VARIATION des PARAMETRES

Comme nous l'avons dit dans les spectres de nos composés en plus des raies principales qui seules, par leur indexation et leurs intensités relatives conduisent à une structure cubique face centrée (type Ca F_2 Groupe Spatial $\text{Fm}\bar{3}\text{m}$) avec des paramètres $5,31 \leq a' \leq 5,64 \text{ \AA}$ existent des raies secondaires qui obligent à prendre un paramètre double moyennant quoi elles s'indexent toutes avec une très bonne précision. Lorsque le fond continu sur les spectres X est important, ce qui est le cas pour les composés au Samarium, Europium et Gadolinium ces raies secondaires sont peu ou pas visibles.

Dans le cas des composés obtenus à partir de Ln_2MoO_6 et M MoO_4 ($\text{M} = \text{Cd, Ca, Sr, Pb}$) le paramètre a de la maille cubique varie linéairement comme suit

TABLÉAU XXV

M	:	de ($\text{\AA}$) pour Ln	à	($\text{\AA}$) pour Ln	
	:		:		
	:		:		
Cd	:	11,114	La	10,624	Yb
Ca	:	11,21	La	10,845	Gd
Sr	:	11,26	La	10,95	Sm
Pb	:	11,291	La	11,018	Eu
	:		:		
	:		:		

$a(\text{\AA})$ de
 $M\text{Ln}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$
 et
 $M\text{Ln}_6\text{Mo}_4\text{O}_{22}$

-70-

$M \begin{cases} \times & \text{Cd} \\ \circ & \text{Ca} \\ \bullet & \text{Sr} \\ + & \text{Pb} \end{cases}$


11.40

Fig 7'

11.00

10.80

10.60



La figure 7' traduit les variations des paramètres observés. Nous avons porté en abscisses les paramètres des phases cubiques des oxydes Ln_2O_3 et en ordonnée ceux des composés $\text{M}'\text{Ln}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$ et $\text{M}'\text{Ln}_6\text{Mo}_4\text{O}_{22}$. Ce choix des phases cubiques Ln_2O_3 a été fait car nous avons là une série homologue dont le type de structure appelée Bixbyte dérive de la structure fluorine.

Le cas des composés à l'Europium est à signaler, car exception faite de $\text{CdEu}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$, ceux obtenus avec Ca, Sr, Pb ont des paramètres inférieurs à ceux donnés par les droites. La détermination du paramètre des composés à l'europium est peu précise car avec l'anti-cathode au Cuivre utilisée les spectres obtenus ont une lisibilité qui décroît du Lanthane à l'Europium pour redevenir progressivement meilleure ensuite et être excellente pour l'Holmium, Erbium, Yttrium, Thulium, Ytterbium.

En ce qui concerne les composés $\text{M}'\text{Ln}_4\text{Mo}_3\text{O}_{15}$ F une variation décroissante du paramètre du Lanthane à l'Europium s'observe mais la linéarité n'est pas excellente. Ceci s'explique car pour ces composés la valeur du paramètre varie avec la température de préparation (Tableau XXIII) et la même température n'a pas toujours été adoptée pour les raisons que nous avons indiquées précédemment.

Les composés obtenus avec CaWO_4 , SrWO_4 , PbWO_4 ont en général un paramètre très légèrement supérieur à ceux obtenus avec les molybdates correspondants. La variation de ces paramètres est aussi linéaire en fonction des paramètres des phases cubiques Ln_2O_3 .

Si l'on classe les composés non par rapport au cation divalent mais par rapport à une terre rare ; Lanthane par exemple, la

variation du paramètre entre le composé au Cadmium et celui au Calcium ($11,114 \text{ \AA}$ et $11,21 \text{ \AA}$) semble anormale compte tenu de leurs rayons ioniques respectifs qui sont très proches ($\text{Cd}^{2+} 0,97$; $\text{Ca}^{2+} 0,99$). L'examen de leurs formules moléculaires globales $\text{CaLa}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$ et $\text{CaLa}_6\text{Mo}_4\text{O}_{22}$ montre que dans le cas du dernier la proportion en ion La^{3+} a augmenté par rapport à celle du composé au Cadmium ce qui explique ce décalage entre les paramètres.

B - DETERMINATION du NOMBRE de MOLECULES par MAILLE : Z

Les densités des différents types de composés ont été prises et sont consignées dans le tableau XXVI, ainsi que le nombre Z de molécules par maille.

TABEAU XXVI

	$\text{CaLa}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$	$\text{CaLa}_6\text{Mo}_4\text{O}_{22}$	$\text{SrLa}_6\text{Mo}_4\text{O}_{22}$	$\text{PbLa}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$	$\text{NaLa}_4\text{Mo}_3\text{O}_{15}\text{F}$
$a(\text{\AA})$	11,114	11,21	11,26	11,291	11,32
d_4^{24}	5,80	5,60	5,67	5,98	5,05
Z	3,96	2,93	2,91	3,97	3,92

Une maille élémentaire du type CaF_2 contient 4 molécules ; 32 molécules par maille octuple (paramètre double) soient 32 cations et 64 anions. Considérons les deux formules types $\text{M Ln}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$ et $\text{M Ln}_6\text{Mo}_4\text{O}_{22}$; les nombres Z de molécules théoriques par maille

type "fluorine" sont :

- pour la première $Z_{th} = \frac{64}{16} = \frac{32}{1 + 4 + 3} = 4$

- pour la seconde $Z_{th} = \frac{64}{22} = \frac{32}{1 + 6 + 4} = 2,91$

En comparant ces résultats théoriques avec ceux obtenus expérimentalement (Tableau XXVII) on constate un bon accord. Les formules molaires peuvent être écrites soit relativement à la maille octuple (Tableau XXVII 1ère ligne) qui est la maille conduisant au véritable groupe spatial, soit relativement à la maille simple (Tableau XXVII 2ième ligne). Dans le cas de Ca, Sr, Pb les limites du domaine d'existence de la phase fluorine sont calculées relativement à ces deux mailles.

TABLÉAU XXVII

Cd ²⁺	:	Ca ²⁺	:	Sr ²⁺	:	Pb ²⁺
	:		:		:	
Cd ₄ La ₁₆ Mo ₁₂ O ₆₄	:	Ca _{3,55} La _{16,60} Mo _{11,85} O ₆₄	:	IDENTIQUE	:	Pb ₄ La ₁₆ Mo ₁₂ O ₆₄
	:	-Ca _{2,91} La _{17,46} Mo _{11,64} O ₆₄	:		:	-Pb _{2,91} La _{17,46} Mo _{11,64} O ₆₄
	:		:	au	:	
(Cd _{0,5} La ₂ Mo _{1,5} O ₈)	:	(Ca _{0,45} La _{2,07} Mo _{1,48} O ₈)	:	CALCIUM	:	(Pb _{0,5} La ₂ Mo _{1,5} O ₈)
	:	-Ca _{0,36} La _{2,18} Mo _{1,46} O ₈	:		:	-Pb _{0,36} La _{2,18} Mo _{1,46} O ₈
	:		:		:	

Dans la suite de notre exposé nous continuerons pour des raisons de simplicité d'écriture à employer les deux formules



C - CONCLUSIONS

On peut constater que si l'ion Ln^{3+} pour un cation divalent déterminé impose un paramètre moyen ; ce cation divalent quant à lui de par sa nature fait varier ce paramètre mais surtout impose un domaine d'existence. Un examen des résultats montre que le domaine semble d'autant plus étendu que le rayon ionique M^{2+} est plus proche de celui de Ln^{3+} et même un peu plus grand mais nous n'en déduisons pour l'instant rien de précis si ce n'est que peut-être dans ce cas un même site peut accueillir les deux ions différents. Ceci est d'ailleurs très logique puisque la structure est certainement proche de la structure fluorine idéale où tous les cations occupent le même site.

En annexe sont donnés les résultats concernant les diffractogrammes obtenus pour les composés préparés (hkl ; d_{obs} ; d_{cal} ; I/I_0).

III - MESURES MAGNETIQUES

---:---:---:---:---:---:---:---

Nous employons la méthode de FARADAY. La susceptibilité magnétique est donnée par la formule :

$$F = m \chi H \frac{\partial H}{\partial x}$$

Dans les tableaux (XXVII $\longrightarrow$ XXX) nous donnons pour chaque composé étudié la susceptibilité molaire et son inverse à différentes températures. Les corrections diamagnétiques ont été effectuées en utilisant les valeurs données par NICH L (66). Les figures 8 - 9 - 10 montrent, que dans tout le domaine de température (77 - 700° K) étudié, ces composés suivent une loi au type CURIE - WEISS

$$\chi_M = \frac{C}{T - \theta}$$

Dans le tableau XXXI, sont notés pour chaque composé les valeurs de θ , de Ca (constante rapportée à un atome magnétique) du moment magnétique effectif (μ exprimé en magnétons de BOHR comparé au moment théorique des cations Ln^{3+} calculé par VAN VLECK (67) et aux moments expérimentaux mesurés pour différents composés (66).

TABLEAU XXVII

$Gd_2 Mo O_6$			$Na Gd (Mo O_4)_2$		
$T(^{\circ}K)$	$\chi_M \times 10^6$ u.e.m. C.G.S.	$1/\chi_M$	$T(^{\circ}K)$	$\chi_M \times 10^6$ u.e.m. C.G.S.	$1/\chi_M$
78	175 090	5,71	289	26 570	37,6
80	166 230	6,02	292	26 276	38,1
85	157 170	6,36	307	24 777	40,36
90	150 660	6,64	334	22 925	44,62
96	142 300	7,03	355	21 285	47,00
100	135 190	7,40	387	19 486	51,32
110	127 600	7,84	436	17 141	58,34
119	116 860	8,56	463	16 165	61,81
136	101 360	9,87	511	14 882	67,2
145	97 865	10,22			
160	88 267	11,32			
170	83 937	11,91			
179	79 608	12,56			
188	76 104	13,14			
200	72 446	13,80			
214	68 835	14,53			
223	66 888	14,95			
234	63 398	15,77			
250	59 807	16,72			
270	55 813	17,92			
280	51 235	18,44			
316	47 610	21,00			
360	41 312	24,20			
456	33 330	30,02			
533	28 675	34,91			
575	26 740	37,70			

TABLEAU XXVIII

Cd $\text{Gd}_4\text{FeO}_3\text{U}_{16}$				Cd $\text{Er}_4\text{FeO}_3\text{U}_{16}$			
T(°K)	$\chi_M \times 10^6$ u.e.m. G.S.		$1/\chi_M$	T(°K)	$\chi_I \times 10^6$ u.e.m. G.S.		$1/\chi_M$
78	365 990	:	2,73	92	152 090	:	6,57
89	315 300	:	3,17	311	141 160	:	7,08
95	300 270	:	3,33	337	128 610	:	7,77
100	283 760	:	3,53	380	114 530	:	8,73
105	273 160	:	3,66	420	105 250	:	9,50
110	262 130	:	3,81	450	96 445	:	10,37
119	247 160	:	4,10	505	87 456	:	11,43
126	228 400	:	4,38	544	82 239	:	12,16
131	221 600	:	4,51	619	73 100	:	13,68
136	215 070	:	4,65			:	
147	203 440	:	4,92			:	
157	185 920	:	5,38			:	
168	175 640	:	5,69			:	
176	166 210	:	6,02			:	
187	157 580	:	6,35			:	
192	152 580	:	6,55			:	
201	146 570	:	6,82			:	
213	138 810	:	7,20			:	
230	129 060	:	7,75			:	
245	122 050	:	8,15			:	
253	119 300	:	8,38			:	
266	113 900	:	8,78			:	
286	105 800	:	9,45			:	
315	96 647	:	10,35			:	
345	86 646	:	11,54			:	
382	78 458	:	12,75			:	
410	73 223	:	13,66			:	
447	67 114	:	14,90			:	
483	62 035	:	16,12			:	
529	57 347	:	17,44			:	
571	53 206	:	18,80			:	
609	53 158	:	19,87			:	
647	47 347	:	21,12			:	
:		:				:	
:		:				:	

TABLEAU XXIX

Cd Dy ₂ FeO ₃ O ₁₃				Cd Ho ₂ FeO ₃ O ₁₆			
T(°K)	$\chi_M \times 10^6$	1/ χ_M		T(°K)	$\chi_M \times 10^6$	1/ χ_M	
	u.e.m.	C.G.S.			u.e.m.	C.G.S.	
78	601	120	1,66	289	186	750	5,36
80	572	130	1,75	307	175	110	5,71
95	532	150	1,88	325	164	610	6,07
102	497	120	2,01	354	150	940	6,63
110	467	870	2,14	393	137	710	7,26
115	440	120	2,25	425	127	750	7,83
125	418	590	2,39	457	119	790	8,35
131	401	120	2,49	517	107	1000	9,35
139	377	310	2,65	578	95	857	10,43
146	360	730	2,71	623	89	533	11,17
155	339	660	2,94				
164	322	230	3,10				
185	286	150	3,49				
193	278	910	3,58				
207	261	180	3,83				
225	244	200	4,09				
240	228	160	4,38				
258	214	90	4,66				
268	209	270	4,78				
281	198	130	5,05				
290	188	360	5,31				
313	174	340	5,74				
335	161	560	6,19				
364	148	700	6,73				
390	138	110	7,23				
415	131	140	7,53				
457	119	710	8,36				
517	107	1030	9,34				
546	102	250	9,78				
619	92	196	10,85				
659	85	153	11,70				


TABELAU XXX


Cd Nd ₄ Mo ₃ U ₁₆						
T(°K)	$\chi_M \times 10^6$	$1/\chi_M$	T(°K)	$\chi_M \times 10^6$	$1/\chi_M$	
	u.e.m. C.G.S.			u.e.m. C.G.S.		
78	61 106	16,36	235	24 442	40,91	
86	55 347	18,07	245	23 507	42,54	
92	52 638	19,00	254	22 735	43,98	
96	51 269	19,50	266	22 017	45,42	
101	49 115	20,36	273	21 434	46,65	
105	47 557	21,03	287	20 391	49,04	
114	44 712	22,37	303	19 510	51,25	
121	42 611	23,47	314	18 901	52,91	
129	40 173	24,89	350	17 194	58,16	
143	36 853	27,13	370	16 191	61,76	
150	35 303	28,28	380	15 784	63,35	
160	33 263	30,06	400	15 026	66,55	
172	31 366	31,88	417	14 362	69,63	
190	29 062	34,41	470	13 007	76,88	
204	27 301	36,63	502	12 126	82,47	
211	26 350	37,95	540	11 381	87,86	
222	25 553	39,15	575	10 717	93,31	
			634	9 891	101,1	


TABLÉAU XXXI

COMPOSE	$\theta (^{\circ}\text{K})$	C_A	$M_{\text{co travail}}^{\text{exp}}(\beta)$	$M_{\text{th Ln}^{3+}}^{\text{exp}}(\beta)$	$M_{\text{autres auteurs (66)}}^{\text{exp Ln}^{3+}}$
$\text{Ca Nd}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$	- 30	1,64	3,63	3,68	3,66 - 3,70
$\text{Gd}_2 \text{Mo O}_6$	- 16	7,82	7,90	7,94	7,87 - 7,92
$\text{Na Gd (Mo O}_4)_2$	- 15	7,75	7,88	"	"
$\text{Ca Gd}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$	- 16	7,81	7,89	"	"
$\text{Ca Dy}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$	- 18	13,88	10,53	10,6	10,48 - 10,51
$\text{Ca Ho}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$	- 14	13,80	10,50	10,6	10,44 - 10,52
$\text{Ca Er}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$	- 10	11,11	9,45	9,6	9,44 - 9,53

Sur la figure 8 relative aux composés contenant du Gadolinium nous avons pris trois échelles différentes pour 1/ afin de rapporter ces trois composés à un nombre équivalent d'atomes magnétiques.







L'examen de cette figure ainsi que des résultats consignés dans le tableau (XXXI) montre que quel que soient la nature et la symétrie du site dans lequel se trouve l'ion Ln^{3+} les différences entre les valeurs (θ , C_A , μ_B) sont insignifiantes.

CONCLUSION

Cette étude nous a permis de vérifier les valeurs du paramagnétisme des terres rares mais non de se faire une opinion quant à la nature du site occupé par les ions Ln^{3+} .

Nous n'avons pas rapporté les résultats obtenus avec les oxydes Ln_2O_3 mais les courbes que nous avons tracées, en particulier avec le Gadolinium et le Dysprosium, étaient parfaitement superposables aux courbes des figures 8, 9, 10 pour deux ions Ln^{3+} identiques.

IV - LUMINESCENCE CRISTALLINE


-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

A - INTRODUCTION

Nous avons activé quelques uns de nos composés à l'aide de l'ion Eu^{3+} car l'étude de son spectre de fluorescence est souvent d'un apport très précieux pour la connaissance de la symétrie du site de l'ion auquel il se substitue. Les composés dopés à Eu^{3+} et irradiés par un rayonnement ultraviolet ont une émission rouge. C'est OFELT (80) qui a le premier établi, par le calcul, les schémas des niveaux d'énergie de l'ion libre Eu^{3+} (Fig 11). L'état fondamental est le niveau $^7\text{F}_0$ du multiplet $^7\text{F}_j$. Les transitions donnant une fluorescence dans le visible ont lieu entre les niveaux ^5D et ^7F .

La configuration de l'ion Eu^{3+} est $4f^6$. Placé dans un cristal il est soumis, de la part des ions qui l'entourent, à un champ électrique interne appelé : champ cristallin. La protection des 6 électrons optiques de la couche 4 f par la couche $5s^2 5p^6$ fait que la décomposition des niveaux due à ce champ cristallin est, en principe, plus faible que celle due au couplage spin-orbite. La décomposition des niveaux en sous niveaux pour un nombre quantique J est fonction de la symétrie du champ cristallin comme l'indique le tableau (XXXII).

Fig 11



TABLBAU XXXII

J	0	1	2	3	4	5
Symétrie du site						
Cubique ou octaédrale	1	1	2	3	4	4
Hexagonale	1	2	3	5	6	7
Trigonale	1	2	3	5	6	7
Tétragonale	1	2	4	5	7	8
Rhombique Monoclinique ou Triclinique	1	3	5	7	9	11

L'étude de l'émission de Eu^{3+} dans les oxydes de terres rares tels Gd_2O_3 , Y_2O_3 , Lu_2O_3 a permis de déterminer la structure fine de ces matrices (81)(82)(83). Quelques uns de ces composés ont un intérêt industriel et trouvent une application dans la télévision en couleur ou bien dans la fabrication de matériaux lasers. Ainsi de nombreux travaux de recherche ont été entrepris sur le rendement lumineux de tels corps et l'influence de différents facteurs qui contrôlent l'intensité de l'émission. VAN UITERT, en particulier, publie, depuis 10 ans, ses études sur la luminescence des ions Eu^{3+} et Tb^{3+} dans les phases Scheelites normales ou substituées (85)(86)(87)(88)(89).


Signalons toutefois que les difficultés physiques rencontrées pour la préparation des matériaux et surtout la mauvaise définition des spectres d'un grand nombre de ces corps luminescents fait que les calculs théoriques sur les niveaux ne sont pas possibles et que la connaissance de processus fondamental de luminescence reste en grande partie inconnue (84).

B - PRÉPARATION des MATÉRIAUX

Nous avons essayé d'introduire l'ion activateur, selon les préparations, dans le site occupé soit par des ions Ln^{3+} (La^{3+} , Gd^{3+} , Y^{3+}) soit par des ions M^{2+} (Cd^{2+} , Ca^{2+} , Sr^{2+}).

a) SUBSTITUTION de Ln^{3+}


Eu^{3+} peut être introduit dans ces matrices à l'aide de Eu_2O_3 , du molybdate Eu_2MoO_6 ou bien d'une phase du type "fluorine" $\text{CdEu}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$. Ces diverses méthodes conduisent à des spectres d'émission identiques pour une phase donnée mais la pureté et la cristallisation du produit sont supérieures si l'on part du molybdate de lanthanide dopé $(\text{Ln}_{1-x}\text{Eu}_x)_2\text{MoO}_6$. Celui-ci s'obtient par chauffage de 700 à 1000° pendant 48 h du mélange suivant :




La phase "fluorine" s'obtient ensuite, comme nous l'avons signalé auparavant, par chauffage du mixte $\text{M MoO}_4, (\text{Ln}_{1-x}\text{Eu}_x)_2\text{MoO}_6$ en proportion et à la température appropriée selon M^{2+} .

b) SUBSTITUTION de M^{2+}

La substitution partielle ou totale des ions divalents par un couple ($M_{0,5}^{+}$, $Ln_{0,5}^{3+}$) dans les scheelites, en particulier, est une opération très courante puisqu'elle a permis de nombreux auteurs d'obtenir des renseignements précieux au sujet de l'émission de Eu^{3+} dans ces matrices. Avec l'espoir de doper le site occupé par les ions divalents, nous avons donc préparé les scheelites $(Na_x Eu_x)M_{(1-2x)}MoO_4$ suivant le schéma de réaction :




En fait, la préparation suivante en trois étapes



conduit à de très bons résultats et c'est celle que nous avons adoptée car elle permet, par sa souplesse, à partir des différentes phases scheelites d'obtenir différentes variétés de composés dopés.

Nous avons aussi obtenu des phases "fluorines" à partir de scheelites totalement substituées $(M_{0,5}Ln_{0,5})MoO_4$. Nous avons dopé la scheelite où $Ln = Y$ au cours de sa préparation comme suit :



Pour une phase déterminée nous avons essayé plusieurs types de préparations et nous avons adopté celle qui conduit à la meilleure cristallisation et à la plus grande pureté car ces facteurs sont essentiels en luminescence.

C - DISCUSSION des RÉSULTATS

La première constatation qui s'impose (Fig. 12→25¹) est que l'émission de l'ion Eu^{3+} n'est pas celle qui correspond à Eu^{3+} en site octaédrique qui est le seul site occupé par des cations dans les vraies phases fluorines.

L'examen montre ensuite que si dans la région 5800 - 6300 Å le spectre de l'ion Eu^{3+} est bien observé (transitions $^5\text{D}_0 \rightarrow ^7\text{F}_0$; $^5\text{D}_0 \rightarrow ^7\text{F}_1$; $^5\text{D}_0 \rightarrow ^7\text{F}_2$) dans la région des plus courtes longueurs d'onde et en particulier vers 5300 - 5500 Å (transitions issues du niveau excité $^5\text{D}_1$) on n'observe aucune raie. Ainsi, l'absence de raies provenant des niveaux excités supérieurs ne permet pas une attribution précise des raies nombreuses et larges (même pour des spectres de fluorescence obtenus sous grande dispersion) de la région 5800 - 6300 Å et par là même la connaissance de la véritable symétrie du site qui n'est ni cubique, ni hexagonale, ni trigonale car il y a, semble-t-il, plus de trois raies appartenant au groupe $^5\text{D}_0 \rightarrow ^7\text{F}_2$ (pour un spectre obtenu sans grande dispersion).

Nous avons voulu comparer les spectres obtenus avec ceux des molybdates de lanthanides dopés ; spectres déjà publiés (90)(91) et nous avons constaté une réelle similitude.

Les deux molybdates de lanthanides pris comme bases de comparaisons sont $(\text{La}_{0,95}\text{Eu}_{0,05})\text{MoO}_6$ (1) et $(\text{Y}_{0,98}\text{Tb}_{0,02})\text{MoO}_6$ (2). Nous savons, et la figure 26 permet de le rappeler, que La_2MoO_6 et Y_2MoO_6 appartiennent à deux types de structure, le premier à son propre type, le second au type $\text{Bi}_2\text{NbO}_5\text{F}$ avec une légère distorsion monoclinique (77)(78). Pour la série des molybdates du Lanthane au Lutétium existe une variation constante des structures. Ainsi, le type La_2MoO_6 subit une distorsion de plus en plus importante du La au Nd. A partir du Samarium, la structure rappelle celle de $\text{Bi}_2\text{NbO}_5\text{F}$ avec une distorsion importante qui diminue pour devenir quasiment nulle pour Y, Tm, Yb et nulle pour Lu.

Les différences en ce qui concerne les spectres d'émission obtenus pour (1) et (2) sont en fait très faibles et c'est ce qui complique les comparaisons comme nous allons le voir. On peut néanmoins les résumer comme suit :

Région 5800 Å $^5\text{D}_0 \longrightarrow ^7\text{F}_0$

La transition $J=0 \longleftrightarrow J=0$ est interdite mais BLASSE et BRILL (92) ont montré qu'elle se trouve permise en tant que transition dipolaire électrique pour les "phosphores" possédant des sites à symétrie Cs , Cn ou Cnv . La raie de cette transition a une intensité un peu plus grande pour Y_2MoO_6 que pour La_2MoO_6 mais elle est faible dans les deux cas.

Région 5920 - 5950 Å $^5\text{D}_0 \longrightarrow ^7\text{F}_1$

L'intensité de cette bande est relativement faible car elle est due à une transition dipolaire magnétique. Il n'y a pas de différence entre les deux spectres.

Région 6100 - 6300 Å $^5\text{Do} \longrightarrow ^7\text{F}_2$

Dans les deux cas, l'intensité du groupe de raies est très forte par rapport à celle du groupe $^5\text{Do} \longrightarrow ^7\text{F}_1$, ce qui implique la nature de transition dipolaire électrique (les transitions dipolaires électriques ont des émissions beaucoup plus intenses que les transitions dipolaires magnétiques). Ceci est logique puisque les deux sites Ln^{3+} dans (1) et (2) n'ont pas de centre d'inversion. En effet, d'après la règle de parité de LAPORTE la présence d'un centre d'inversion interdit les transitions dipolaires électriques mais permet les transitions dipolaires magnétiques. Ainsi le rapport des intensités des émissions $^5\text{Do} \longrightarrow ^7\text{F}_2 / ^5\text{Do} \longrightarrow ^7\text{F}_1$ est utile à la connaissance de la symétrie car il a permis de prévoir dans certains cas (93) la présence d'un centre de symétrie.


Sur nos spectres qui n'ont pas été obtenus sous grande dispersion, on voit deux groupes de raies relatifs à cette transition dont les sommets sont légèrement déplacés vers les grandes longueurs d'onde de (1) à (2).


(1) $(\text{La}_{0,95}\text{Eu}_{0,05})_2 \text{MoO}_6$	:	6090 - 6250 Å
(2) $(\text{Y}_{0,98}\text{Eu}_{0,02})_2 \text{MoO}_6$	:	6100 - 6275 Å

Le rapport des intensités des groupes 6275 Å / 6100 Å est un peu plus important pour (2) que pour (1).

L'étude détaillée pour quelques uns des composés dopés est donnée dans ce qui suit.

Fig 12






I

Fig 14

-95-



③



 $T \begin{cases} \textcircled{1} 300^\circ\text{K} \\ \textcircled{2} 77^\circ\text{K} \end{cases}$ 


Fig 15



$$x = 0,01$$

$$T \begin{cases} \textcircled{1} 300^\circ\text{K} \\ \textcircled{2} 77^\circ\text{K} \end{cases}$$

④






Fig 17

-98-





Fig 18

- 99 -




I

-100-

Fig 19

2000



$$x = 0.05$$

⑧

$$T \begin{cases} \textcircled{1} 300^\circ\text{K} \\ \textcircled{2} 77^\circ\text{K} \end{cases}$$

1000

00

6000

 $\lambda(\text{\AA})$

6110


6225

5930

5800

①

②






Fig 21

- 102 -




Fig 22

-103-




Fig 23

- 104 -






Fig 24



$$x = 0,01$$

$T = 77^\circ \text{K}$

(13)



1) SUBSTITUTION de Ln^{3+}

a) Composés au Cadmium

- $\text{Cd}(\text{La}_{0,95}\text{Eu}_{0,05})_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$ (3). Les essais effectués avec des concentrations en Eu^{3+} de 1, 2, 5 % ne montrent aucune modification dans les spectres qui sont différents de (1) et (2) en ce sens qu'ils semblent dus à une émission de Eu^{3+} dans un site un peu plus symétrique car les deux groupes de raies du niveau $^5\text{Do} \longrightarrow ^7\text{F}_2$ sont rassemblés. Toutefois la raie à $5800 \text{ \AA}$ ($^5\text{Do} \longrightarrow ^7\text{Fo}$) dont l'existence limite le site à certaines symétries n'a pas totalement disparue. Le rapport d'intensités $^5\text{Do} \longrightarrow ^7\text{F}_2 / ^5\text{Do} \longrightarrow ^7\text{F}_1$ reste pratiquement inchangé par rapport à (1) ou (2). On note la présence d'un groupe de raies provenant certainement du niveau $^5\text{D}_1 \longrightarrow ^7\text{F}_2$ à $5630 \text{ \AA}$ lorsque l'on opère à 77° K .

- $\text{Cd}(\text{Y}_{0,99}\text{Eu}_{0,01})_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$ (4). Pour des concentrations en Eu^{3+} allant de 1 à 5 % l'intensité lumineuse double mais le spectre se modifie très légèrement. Avec 1 % le spectre est parfaitement identique à $(\text{Y}_{0,98}\text{Eu}_{0,02})\text{Mo}_3\text{O}_{16}$ (2) mais l'intensité est 10 fois moins importante. Le rapport des intensités est conservé. Avec 2 % il n'y a aucune différence et avec 5 % on note un léger déplacement de la raie à $6270 \text{ \AA}$ ($6270 \text{ \AA} - 6255 \text{ \AA}$).

- $\text{Cd}(\text{Gd}_{0,95}\text{Eu}_{0,05})_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$ (5). Le rapprochement des deux groupes de raies de la transition $^5\text{Do} - ^7\text{F}_2$ est plus accentué ($6120 - 6230$) que pour (4) la raie $^5\text{Do} \longrightarrow ^7\text{Fo}$ s'est affaiblie ainsi que le rapport d'intensités $^5\text{Do} \longrightarrow ^7\text{F}_2 / ^5\text{Do} \longrightarrow ^7\text{F}_1$ toujours par rapport à (4). A 77° K le groupe relatif à $^5\text{D}_1 \longrightarrow ^7\text{F}_2$ est apparent.

b) Composés au Calcium et au Strontium

- Ca (La_{0,99} Eu_{0,01})₆ Mo₄ O₂₂ (6). L'intensité émise est très importante (les intensités données sur les figures 12 - 25 sont comparatives mais données en unités arbitraires).

On note que le groupe des raies $^5\text{Do} \rightarrow ^2\text{F}_2$ n'est pas scindé comme pour (1) et (2) mais pas non plus unique comme pour (3). Le groupe $^5\text{Do} \rightarrow ^7\text{Fo}$ est très peu prononcé.

- Ca (Gd_{0,95} Eu_{0,05})₆ Mo₄ O₂₂ (7). Ici le groupe $^5\text{Do} \rightarrow ^7\text{F}_2$ est très scindé et il est proche du spectre (5) avec toutefois une intensité 25 fois plus importante. Ces deux groupes ont des intensités beaucoup plus comparables que dans la plupart des autres cas.

- Sr (La_{0,95} Eu_{0,05})₆ Mo₄ O₂₂ (8). Le spectre est parfaitement identique à celui du composé au calcium (6). Son intensité est comparable à celle du produit au calcium dopé à 5 % d'Eu³⁺ (ce spectre n'est pas reproduit ici). C'est à dire environ 40 fois celle du produit au Cadmium (3).

Le niveau $^5\text{Do} \rightarrow ^7\text{Fo}$ est assez marqué.

2) SUBSTITUTION de M²⁺

a) Composés au Casmium

- (Na_{0,1} Eu_{0,1}) Cd_{0,5} La₄ Mo₃ O₁₆ (9). Ce spectre est intermédiaire entre (3) et (6) car le deuxième groupe de raies de $^5\text{Do} \rightarrow ^7\text{F}_2$ commence à se marquer. Son intensité est environ 3 fois celle de (3).

- $(\text{Na}_{0,1} \text{Eu}_{0,1}) \text{Cd}_{0,8} \text{Y}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$ (10). Ce spectre est identique aux spectres (2) et (4), mais son intensité est de 2 fois celle de (2) et 20 fois celle de (4).

b) Composé au Calcium

- $(\text{Na}_{0,05} \text{Eu}_{0,05}) \text{Ca}_{0,9} \text{La}_6 \text{Mo}_4 \text{O}_{22}$ (11). Ce spectre est identique à (6).

c) Autres composés

- $\text{Na}_{0,5} (\text{Y}_{0,45} \text{Eu}_{0,05}) \text{La}_6 \text{Mo}_4 \text{O}_{22}$ (12). Ce spectre est à la fois proche de (1) (pour les positions de ses raies) et de (2) pour le rapport d'intensité des deux groupes de raies de la transition $^5\text{Do} \rightarrow ^7\text{F}_2$. Il s'apparente aussi à (7) et (8).

- $(\text{Na}_{0,5} \text{Y}_{0,5}) (\text{La}_{0,99} \text{Eu}_{0,01})_6 \text{Mo}_3 \text{WO}_{22}$ (13). Ce spectre est très proche de ceux de (6) et (8).

D - CONCLUSION

De l'examen comparatif de ces spectres entre eux et avec ceux de $(\text{La}_{0,95} \text{Eu}_{0,05})_2 \text{MoO}_6$ (1) et $(\text{Y}_{0,98} \text{Eu}_{0,02})_2 \text{MoO}_6$ (2) il ressort :

a) Dans le cas des produits à l'Yttrium(4) (10) l'ion Eu^{3+} se trouve dans un site identique à celui du produit (2) que l'on ait dopé le site Y^{3+} ou celui de Cd^{2+} .

b) Les produits au Lanthane offrent un bel aspect de variation continue avec (3) (9) (6) (13) (8) (12) par l'éclatement progressif mais très net du groupe $^5\text{Do} \rightarrow ^5\text{F}_2$ ce qui peut être interprété avec prudence comme une modification structurale sans doute très légère.

Si pour (8) nous avons un spectre se rapprochant de celui de (1) avec toutefois un sommet à $6110 \text{ \AA}$ au lieu de $6090 \text{ \AA}$ au lieu de $6230 \text{ \AA}$, pour (12) le rapport d'intensité des deux groupes de raies de la transition $^5\text{Do} \rightarrow ^7\text{F}_2$ permet de rapprocher ce spectre du spectre (2).

Le cas du spectre (3) est intéressant car il semble que pour ce corps la structure soit un peu plus symétrique (Sous-niveaux moins séparés). En effet, la symétrie du site est peut-être identique pour toute cette série mais le fait que les raies soient plus proches signifie que la distorsion par rapport à une symétrie plus élevée est plus faible.

c) Les spectres au Gadolinium, en particulier celui avec le calcium, semblent mieux définis, ce qui est normal, car c'est avec le Gadolinium que l'ion Eu^{3+} de par sa présence ne modifie pratiquement par l'entourage en raison de l'identité de taille entre les deux ions Gd^{3+} et Eu^{3+} . La distorsion qu'il provoque lorsqu'il se substitue à Ln^{3+} est nette dans le cas des composés à l'Yttrium puisque les spectres obtenus avec une concentration en Eu^{3+} de 5 % sont un peu différents de ceux issus des composés dopés à 1 %.

La position d'un sommet à $6230 \text{ \AA}$ de (5) rapproche ce spectre de celui de (1) mais ce même sommet pour (7) est à $6250 \text{ \AA}$. Les rapports d'intensité des deux groupes de la transition $^5\text{Do} \rightarrow ^7\text{F}_2$ par contre sont plutôt en accord avec celui de (2).

d) Les produits au Cadmium sont pratiquement éteints alors que ceux au Calcium et au Strontium présentent une bonne émission lumineuse (2 à 3 fois plus importante que celle d'une scheelite comme $(\text{Na}_{0,1} \text{Eu}_{0,1}) \text{Cd}_{0,8} \text{MoO}_4$ et 10 fois celle de $(\text{Na}_{0,1} \text{Eu}_{0,1}) \text{Ca}_{0,8} \text{MoO}_4$).

Le fait de doper avec des scheelites du type $(\text{Na}_{0,05} \text{Eu}_{0,05}) \text{Cd}_{0,8} \text{MoO}_4$ exalte l'émission en multipliant son intensité par 2 ou 3 par rapport au produit (3). Cela indique que l'environnement de l'ion Eu^{3+} s'est modifié et a substitué aux voisins Cd^{2+} des ions Na^+ alcalins qui permettent une émission plus intense. Nous n'entrerons pas dans le détail à ce sujet mais c'est un phénomène très courant dans les scheelites lié à des facteurs tels que l'énergie de liaison de l'ion dans le cristal. Une approximation de la valeur de cette énergie est donnée, comme dérivant du modèle ionique de la sphère rigide, par l'équation de BORN qui tient compte des forces d'attraction et de répulsion entre anions et cations mais non du changement dans la polarisation du nuage électronique relatif aux oxygènes qui entourent l'ion Eu^{3+} .

Les spectres obtenus à température de l'azote liquide (77°K) sont plus intenses que ceux obtenus à 300°K , ce qui est dû au facteur d'agitation thermique, mais nous n'avons pas observé d'émission de matrice à 77°K et ainsi nous n'avons pas eu la possibilité d'étudier des transferts de charges existant pour certains molybdates et tungstates.


e) Le fait de doper le site de Lu^{3+} ou de M^{2+} conduit à des spectres identiques ou presque ce qui implique que l'ion Eu^{3+} émet dans un site toujours semblable. Ceci peut s'expliquer comme suit :

- soit l'ion Eu^{3+} se déplace par rapport aux sites occupés dans les produits dopés de départ et rend ainsi aléatoires les essais de localisation de Eu^{3+} sur un site déterminé



- soit certains ions Ln^{3+} et M^{2+} occupent des sites identiques ce qui va dans le sens de la conclusion concernant les domaines d'existence (partie II, § III).

Fig 26



- 110 bis -



a) TYPE



b) TYPE



De toutes ces informations celle qui doit être mise en relief, car elle est précise et capitale pour notre étude structurale, est celle-ci : dans $\text{Cd Y}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$ l'un ou un des sites de Y^{3+} est identique à celui qu'il occupe dans $\text{Y}_2 \text{MoO}_6$ (type $\text{Bi}_2 \text{NbO}_5 \text{F}$; Fig 26 b) et nous pouvons extrapoler ce résultat aux terres rares comme Ho^{3+} , Er^{3+} , Tm^{3+} , Yb^{3+} à cause de l'isotypie structurale entre leurs molybdates et les phases "fluorines" obtenues.

l'octaédre Mo O_6 est déformé et sa distorsion croît avec le rayon ionique de la terre rare.

Nous pouvions donc avoir dans nos composés soit l'un ou l'autre des entourages soit même les deux. Pour pouvoir mieux juger nous avons aussi fait les spectres IR de produits de départ tels que $\text{La}_2 \text{Mo O}_6$, $\text{Y}_2 \text{Mo O}_6$, $\text{Gd}_2 \text{Mo O}_6$ qui ont servi de base de comparaison. Les spectres obtenus comme le montrent les figures (27,28 et le tableau 33 ne sont pas très fins mais il est possible de noter que d'une part, les spectres de nos divers composés type "fluorine" sont identiques à quelques détails près et que d'autre part, leur allure s'apparente à celle du spectre de $\text{La}_2 \text{Mo O}_6$; ce qui indiquerait que l'entourage est du type Mo O_4 .

Le fait que les spectres des composés (sauf peut-être celui au Thulium) présentent quatre pics au lieu de deux pour $\text{La}_2 \text{Mo O}_6$ dans la région $750 - 900 \text{ cm}^{-1}$ peut trouver son explication dans un abaissement de symétrie du site de l'ion Mo^{6+} .

Nous allons examiner suivant la symétrie du groupe Mo O_4 les vibrations qui sont actives en IR et les fréquences qui ont été publiées pour quelques composés.

Pour un ion tétraédrique Mo O_4 il y a quatre vibrations normales $\gamma_1 (A_1)$ $\gamma_2 (E)$ $\gamma_3 (T_2)$ $\gamma_4 (T_2)$ dont les fréquences fondamentales données par BUSTY et KELLER (69) pour l'ion en solution sont (en cm^{-1}) : 894, 407, 833, 318.

TABLÉAU XXXIII

BANDES en cm^{-1}

Gd_2MoO_6	Y_2MoO_6	La_2MoO_6	$\text{CdTm}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$	$\text{CdY}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$	$\text{CdGa}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$
410 f	415-580 F	400-430 F	400-430 F	400-470 F	400-430 F
(440					
460 m					
490 m		490 F	(510 ep)	505 F	490 m
515 m					
535 ep					
565 ep					
705 F	705 F		(715 ep)		
775 F	730-830 F		{(775)}	{(770)}	770 F
		770 F	{ } 780 F	{ } 780 F	
			{(815)}	{(815)}	815 F
845 ep					
855 m	855 F	855 F	855	855 F	855 F
			(890 ep)	890 ep	890 F

F = Fort

f = Faible

m = Moyen

ep = Epaulément

() = Pic de présence incertaine

TABLERAU XXXIII (suite)

BANDRES en cm^{-1}


$\text{CdLa}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$	:	$\text{CaLa}_6\text{Mo}_4\text{O}_{22}$	:	$\text{SrLa}_6\text{Mo}_4\text{O}_{22}$
400-480 F	:	400 F	:	400 F
	:		:	
	:	465 F	:	465 F
	:		:	
	:		:	670 ep
	:		:	
	:	695 ep	:	700 ep
	:		:	
770 F	:	770 F	:	770 F
	:		:	
	:	805 F	:	795 F
	:		:	
855 F	:	845 F	:	840 F
	:		:	
895 F	:	885 ep	:	885 ep
	:		:	
	:		:	

F = Fort

ep = Epaulerent

Fig 27 - SPECTRES
I-R

Transmission%



cm⁻¹ 1000

800

600

400

a) Gd_2MoO_6

b) La_2MoO_6

c) $CdTm_4Mo_3O_{16}$





d) $CdY_4Mo_3O_{16}$

e) $CdGd_4Mo_3O_{16}$



% Transmission

Fig 28



a) Symétrie Td

Les molybdates $\text{Ag}_2 \text{MoO}_4$, $\text{Na}_2 \text{MoO}_4$ et $\text{Na}_2 \text{WO}_4$ ont une structure spinelle (groupe spatial O_h^{72}) et l'ion Mo^{6+} est coordonné tétraédriquement aux oxygènes. Dans une symétrie Td la seule transition active en Infra-Rouge est celle de la représentation T_2 (79) et les deux bandes à 835 et 820 cm^{-1} (γ_3 et γ_4) observées (69)(70) confirment l'hypothèse.

b) Symétrie S₄

Les composés qui ont la structure scheelite appartiennent au groupe d'espace C_{4h}^6 avec une symétrie S_4 pour l'ion Mo^{6+} ou W^{6+} . La table de correlations des représentations pour les deux groupes ponctuels Td et S_4 donne :

Td		S_4
A_1	—————→	A
E	—————→	A + B
T_2	—————→	B + E

avec B et E activés en Infra-Rouge, ce qui donne comme vibrations visibles : $\gamma_2(B)$, $\gamma_3(B)$, $\gamma_3(E)$, $\gamma_4(B)$, $\gamma_4(E)$. (Un calcul plus général sur les vibrations englobant les translations et les mouvements de torsion a été fait (71)(72).) Les spectres des scheelites observés confirment cela car ils ont :

- Deux bandes à 320 et 280 cm^{-1} identifiées (70) aux vibrations E et B de γ_4

- une bande large $370 - 430 \text{ cm}^{-1}$ assignée à B de γ_2
- deux bandes (parfois non séparées, avec des fréquences décroissantes lorsque la taille du cation augmente $795 - 835$ pour Ba W O_4 (70) $802 - 873$ pour Ca Mo O_4 (73) dues aux vibrations E et B de γ_3 .

Déjà pour une symétrie aussi simple les auteurs ne sont pas d'accord entre eux. Seule l'attribution des deux vibrations de γ_3 n'est pas contestée. Les fréquences 425 cm^{-1} , 318 cm^{-1} (pour CaMoO_4) ont été attribuées à $\gamma_4(\text{B})$ et $\gamma_4(\text{E})$ mais KHANNA et LIPPINCOTT (73) proposent une autre assignation : la bande à 425 cm^{-1} à $\gamma_4(\text{B})$ et $\gamma_4(\text{E})$ (très peu séparées) et la bande à 320 cm^{-1} à $\gamma_2(\text{B})$, la bande à 280 cm^{-1} serait due à une vibration de torsion.

C - SYMETRIES PLUS BASSES (C_{2v} , C_s par exemple)

La dégénérescence est entièrement levée pour ces deux groupes ponctuels :

Td		C_{2v}
A_1	—————>	A_1
E	—————>	$A_1 + A_2$
T_2	—————>	$A_1 + B_1 + B_2$

seule A_2 n'est pas active en IR ce qui donne huit vibrations. Quant à C_s , toutes les vibrations sont actives ce qui donne neuf bandes. Ce sont ces basses symétries que l'on trouve le plus souvent et en particulier dans des scheelites substituées du type $\text{M}^{\text{I}} \text{Ln}^{\text{III}} (\text{Mo O}_4)_2$.

ZAITSSEV et Coll. (74) ont montré que la symétrie du site S_4 dans les scheelites normales tombe à C_{2v} ou C_s dans certaines de celles-ci.

Leur attribution de bandes est la suivante pour $Cs Er (MoO_4)_2$

$\nu_1(A_1)$	$\nu_3(T_2)$	$\nu_4(T_2)$
931	860 ; 778 ; 695	404 (les spectres sont donnés de 400 à 4000 cm^{-1})

Les résultats sont plus probants pour $Na_2 MoO_4 \cdot 2 H_2O$ (69)(75) dont le groupe spatial est D_{2h}^{14} ou D_{2h}^{15}

$\nu_2(E)$	$\nu_4(T_2)$	$\nu_3(T_2)$
inférieur à 300 cm^{-1}	307 ; 327 ; 342	805 ; (817 - 832) ; 854
$\nu_1(A_1)$		
897 cm^{-1}		

Pour un environnement octaédrique il y a six modes normaux de vibrations $\nu_1(A_{1g})$ $\nu_2(E_g)$ $\nu_3(T_{1u})$ $\nu_4(T_{1u})$ $\nu_5(T_{2g})$ $\nu_6(T_{2u})$ ce qui donne 15 bandes pour une distorsion où la dégénérescence est levée. Ceci explique la complexité du spectre de $Gd_2 MoO_6$. Aucune assignation complète n'a été faite pour de tels groupes.

Puisque les spectres obtenus semblent être ceux d'un groupe MoO_4 on peut essayer d'analyser un peu plus les résultats obtenus.

En ce qui concerne le spectre de $La_2 MoO_6$ où l'ion Mo^{6+} est dans un site de symétrie S_4 la bande à 400 cm^{-1} peut être attribuée à une vibration ν_4 (il serait nécessaire d'avoir le spectre d'absorption de la région 300 - 400 cm^{-1}) et les deux bandes

à 770 et 855 à $\gamma_3(E)$ et $\gamma_3(B)$. L'intensité de la bande $\gamma_3(E)$ doit être le double de celle de $\gamma_3(B)$ puisque ces deux bandes sont issues de $\gamma_3(T_2)$ (triplement dégénérée) et que $\gamma_3(E)$ est doublement dégénérée alors que $\gamma_3(B)$ ne l'est pas ; c'est en effet le cas.

En ce qui concerne les phases "fluorines" dans la région 750 - 900 cm^{-1} au lieu des deux bandes de La_2MoO_6 nous en observons, pour presque toutes ces phases, quatre (très nettement pour le composé au Gadolinium 770 - 815 855 - 890 cm^{-1}). Ceci est explicable si la dégénérescence de γ_3 est totalement levée et si la vibration γ_1 inactive en IR pour les groupes T_d et S_4 devient active. Nous aurions alors un site de plus basse symétrie que T_d et S_4 comme pour $(\text{Cs Er}(\text{MoO}_4))$ et surtout comme pour $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ précédemment cités.

Nous noterons également l'existence d'une bande vers 490 cm^{-1} que l'on retrouve dans les spectres de La_2MoO_6 et de Gd_2MoO_6 . De plus, certains spectres présentent des épaulements vers 700 cm^{-1} .

La bande 770 cm^{-1} $\gamma_3(E)$ de La_2MoO_6 est plus fortement divisée et l'épaulement à 890 cm^{-1} $\gamma_1(A_1)$ plus marqué lorsque la taille de la terre rare augmente dans nos phases fluorines.

D - CONCLUSION

L'étude des spectres IR des phases fluorines comparés à ceux des molybdates constituants montre que les ions Mo^{6+} sont à entourage type MoO_4 avec une symétrie pratiquement identique à S_4 pour $\text{Cd Tm}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$ symétrie qui s'abaisse lorsque la taille de Ln^{3+} augmente, de Tm^{3+} à Gd^{3+} . Le spectre de $\text{Cd La}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$ n'est pas très fin mais il semble toutefois que dans ce composé la symétrie de MoO_4 soit plus élevée que Cs ou C_{2v} .

VI - HYPOTHESE STRUCTURALE

:~::~~::~~::~~::

A - INTRODUCTION

Les deux résultats certains que nous ayons obtenus jusqu'à présent en luminescence cristalline et en spectroscopie Infra-Rouge sont :

- a) dans $\text{Cd Y}_4 \text{ Mo}_3 \text{ O}_{16}$ l'entourage ou un des entourages de Y^{3+} est identique à celui de Y^{3+} dans $\text{Y}_2 \text{ Mo O}_6$ (type $\text{Bi}_2 \text{ Nb O}_5$ F Fig 26 b)
- b) dans $\text{Cd Tm}_4 \text{ Mo}_3 \text{ O}_{16}$ l'entourage de l'ion Mo^{6+} est du type Mo O_4 avec pratiquement une symétrie S_4 qui est celle de Mo O_4 dans Ca Mo O_4 et $\text{La}_2 \text{ Mo O}_6$ (Fig 26 a).

Nous avons la chance d'avoir des spectres de poudre concernant $\text{Cd Ho}_4 \text{ Mo}_3 \text{ O}_{16}$, $\text{Cd Er}_4 \text{ Mo}_3 \text{ O}_{16}$, $\text{Cd Yb}_4 \text{ Mo}_3 \text{ O}_{16}$ et surtout $\text{Cd Tm}_4 \text{ Mo}_3 \text{ O}_{16}$ (Fig 29) très bien définis, avec un fond nul pour un angle $\Theta > 13^\circ$. Sur le spectre de $\text{Cd Tm}_4 \text{ Mo}_3 \text{ O}_{16}$ des raies d'intensité voisine de 0,1 % sont visibles.

Le fait d'avoir cinq spectres isotopes nous a également permis, par comparaison, de nous assurer d'une manière incontestable de l'existence de certaines raies. Sur le spectre de $\text{Cd Y}_4 \text{ Mo}_3 \text{ O}_{16}$ les intensités des raies de surstructure sont totalement différentes de celles des autres spectres car le facteur de diffusion atomique de Y^{3+} n'est guère supérieur à la moitié de celui de Tm^{3+} .




ANTI-CATHODE AU
CUIVRE ($\text{Cu K}\alpha_1$)


-123-


Fig 29


raies visibles sur ce spectre
ou sur celui du composé $\text{CdTm}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$
ou lorsque l'on utilise une anticathode
au molybdène ($\text{Mo K}\alpha$)


raies invisibles











Ainsi des raies comme 211 ; 310 ; apparaissent pour lui avec une anticathode au Cuivre ; ce qui n'est pas le cas pour $\text{Cd Tm}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$. Nous avons aussi fait des essais en chambre DEBYE - SHEPHERD avec une anticathode au molybdate (raie Mo $K\alpha$) ce qui nous a permis d'obtenir certaines raies absentes avec une anticathode au Cuivre (en particulier pour $\text{Cd Tm}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$ 200, 211, 310 et même semble-t-il 220). C'est en raison que tout ceci que nous avons entrepris l'essai de détermination du groupe spatial.

B - ETUDE du SPECTRE X

Sur le spectre de la figure 29 toutes les raies, ainsi que les plans qu'elles représentent, possibles dans un système cubique avec un paramètre $a = 10,650 \text{ \AA}$ sont reproduites de la manière suivante :

- en trait plein, les raies visibles sur le spectre donné ainsi que sur quelques autres, les raies visibles lorsque l'on utilise une anticathode au molybdène (notées : visible avec Mo $K\alpha$), les raies visibles sur le spectre de $\text{Cd Y}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$ (notées : visible avec $\text{Ln}' = \text{Y}$)
- en trait pointillé, les raies invisibles sur tous les spectres avec les deux anticathodes.

Sur 85 raies possibles représentant 137 plans, par suite des coïncidences, nous en observons 55 pouvant représenter 92 plans.

Les 30 raies absentes représentent 45 plans et les deux règles de sélection

$$\begin{array}{ll} \text{hhl} & 1 = 2n(1) \\ \text{okl} & k + 1 = 2n(2) \end{array}$$

permettent d'expliquer l'absence des raies

(1) pour 18 plans + 4 plans

(2) pour 14 plans + 4 plans

(les 4 plans en supplément sont communs à (1) et (2) ce qui fait 36 plans sur 45 (80 %). En retour, il faut voir si parmi les raies présentes certaines n'appartiennent pas uniquement à un plan interdit. Ce n'est pas le cas car si parmi les 92 plans possibles représentés par 55 raies il y en a 8 non permis par l'une des deux règles, ils sont tous les 8 en coïncidence avec 1, 2 ou même 3 autres plans permis et les intensités de ces 8 raies sont très proches de 0,1 - 0,2 % sauf pour la raie 520 - 432 qui a une intensité de 0,75 % mais le calcul a montré, par la suite (Tableau XXXIV) que cette intensité est due entièrement au plan 432.

Nous avons cherché dans les Tables Internationales de Cristallographie le ou les groupes spatiaux obéissant à ces deux règles et par chance nous n'en avons trouvé qu'un : $Pn\bar{3}n$.

C - PLACEMENT des ICNS

a) CATIONS

Pour placer les cations nous disposons d'un certain nombre de sites 2a, 6b, 8c, 12d, 12e, 16f, 24g, 24h, 48i pour les : 4 Cd^{2+} , 12 Mo^{6+} , 16 Tm^{3+} .

Un calcul d'intensité théorique dans le cas d'une maille fluorine idéale avec entourage octaédrique des cations et répartition statistique de ces derniers dans le site (4 a) nous a montré (Tableau XXXIV)

que ces intensités calculées étaient, en fait, proches des intensités observées pour nos phases (facteur de Véracité = 0,089). Nous en avons déduit, vu que l'intensité de ces raies principales est essentiellement due aux cations (pour certaines raies les oxygènes n'interviennent pas) que nous n'avions pas de déplacement des cations par rapport à la maille fluorine mais seulement un ordre, ce qui implique que nos 32 cations soient repartis dans les 3 sites suivants : 8c, 12d, 12e (8c et 12d ont des positions fixes, 12e possède une variable x que nous avons prise égale à 0 dans cette hypothèse)

Mo⁶⁺ La différence de taille entre Mo⁶⁺ et Tm³⁺ ou Cd²⁺, le nombre de ces ions égal à 12 nous font penser qu'il est seul dans un site 12d ou 12e. Le fait qu'il soit à entourage de symétrie S₄ (cf; Infra-Rouge) impose qu'il soit dans le site 12d (sur l'axe de symétrie $\bar{4}$).

Tm³⁺ et Cd²⁺ Ces deux cations ont des rayons ioniques presque identiques et de plus la présence de 16 Tm³⁺ impose que cet ion soit présent dans les deux sites 8c et 12e. Les deux occupations limites sont :

- (1) 4 Cd²⁺, 4 Tm³⁺ en 8c - 12 Tm³⁺ en 12e
- (2) 8 Tm³⁺ en 8c - 4 Cd²⁺, 8 Tm³⁺ en 12e

mais toute occupation intermédiaire est possible.

b) OXYGENES

Pour placer nos 64 oxygènes, nous disposons des sites suivants 16f, 24g, 24h, 48i (position générale). Le choix des 3 premiers ensemble (16 + 24 + 24 = 64) est impossible car cela impose, avec

les sites des cations, une loi d'extinction concernant les plans autres que $h + k + l = 2n$. Or nous avons plusieurs raies et, en particulier, celle du plan 421 qui n'obéissent pas à cette loi ; ainsi les deux seuls sites possibles sont 16f et 48i. La détermination de la position des oxygènes avec un paramètre x pour 16f mais trois paramètres x, y, z pour 48i est très difficile. On peut cependant conduire son approche comme suit :

- nous prenons les ions oxygènes dans les positions occupées dans la maille fluorine ; leur distance par rapport à l'axe Oz de $\frac{a}{4} = 2,66 \text{ \AA}$, nous montre qu'ils ne peuvent pas se rapprocher suivant cet axe

- nous considérons un ion Tm^{3+} en site 12e et nous essayons, par glissement des oxygènes, de retrouver le site de Tm^{3+} dans Tm_2MoO_6 (cf. luminescence cristalline ; Fig 26 b) ; les 8 distances $\text{Tm} - \text{O}$ dans la maille fluorine idéale sont de $2,31 \text{ \AA}$, les valeurs données dans la littérature sont pour un entourage à 8 comprises entre 2,30 et 2,40 ; sur ces 8 oxygènes, 4 peuvent être conservés dans cette position (maille fluorine idéale) pour obtenir le site de Tm^{3+} . Ceci conduit, dans un premier temps, à conserver les 16 oxygènes du site 16f dans leur position primitive fluorine (8c dans le groupe $\text{Fm}\bar{3}\text{m}$) en attribuant à x la valeur $\frac{1}{8}$.

Le placement de l'autre atome d'oxygène, conduisant à 48 points équivalents, doit tenir compte :

1) qu'il doit s'éloigner de l'ion Tm^{3+}

2) qu'il doit se rapprocher de l'ion Mo^{6+} (du site 12d voisin) puisque les distances habituellement trouvées pour des entourages

Mo O₄ sont de 1,84 à 1,88 Å au lieu de 2,31 pour l'entourage Mo O₈ dans la maille fluorine idéale

3) que le déplacement doit surtout se faire suivant Ox et Oy puisque l'empilement est déjà compact suivant Oz

4) qu'il doit donner à Mo⁶⁺ un entourage à 4 de symétrie S₄

5) qu'il doit donner à Tm³⁺ un entourage à 8 de symétrie identique à celui qu'il occupe dans Tm₂ Mo O₆.

En tenant compte de tous ces impératifs nous sommes parvenus, en prenant pour valeur des paramètres de l'oxygène, en position générale 48i

$$\begin{cases} x = \frac{3}{8} - a \\ y = \frac{1}{8} - a \\ z = -\frac{1}{8} \end{cases}$$

avec $a = \frac{0,67}{8}$ aux résultats suivants (Fig 30 → 34)

Sites 12d (Fig 30, 31, 33) Ils sont occupés par Mo⁶⁺. L'entourage est Mo O₄ de symétrie S₄ avec pour distance Mo - O : 1,84 Å. Les quatre autres oxygènes de la position 4a du groupe Fm3m se sont éloignés et ne sont plus liés au molybdène puisque leur distance est Mo - O : 2,83 Å.

Sites 12e (Fig 30, 32, 33) L'entourage du cation Tm³⁺ et Cd²⁺ si celui-ci occupe en partie ce site, est à 8 avec pour distances M - O 4 à 2,31 Å ; 4 à 2,38 Å. Cet entourage est de même symétrie que celui des terres rares dans le type Bi₂ Nb O₅ F.






Fig. 30

Fig 31

LEGENDE
COMMUNE
AUX FIGURES
31 - 32 - 33 - 34


- * $\bigcirc^{2-}$
- Site 12d - ion Mo^{6+}
- $\bigcirc$ Site 12e - ion $\text{Tm}^{3+}(\text{Cd}^{2+})$
- ⊙ Site 8c - ion $(\text{Tm}^{3+}-\text{Cd}^{2+})$



① ETUDE DU SITE 12d

Fig 32

② ETUDE DU SITE 12e







Fig 33

Fig 34

ETUDE DU SITE 8c



Sites 8c (Fig 30, 34). L'entourage du cation est à 8 avec pour distances M - O 2 à 2,31 Å ; 6 à 2,38 Å. Il est issu d'un entourage cubique déformé pour compression du cube suivant l'un de ses 4 diagonales.

D - DISCUSSION des RESULTATS

Même si nous ne connaissons pas le rapport d'occupation des sites 12e et 8c pour les ions Tm^{3+} et Cd^{2+} , le fait que les ions Tm^{3+} soient obligatoirement dans les 2 sites permet de comprendre certains résultats obtenus en luminescence cristalline. Un grand nombre de spectres ne sont ni tout à fait identiques à celui de $Y_2 Mo O_6$ ni à celui de $La_2 Mo O_6$, en particulier pour les composés au Lanthane. L'existence du site 8c différent des sites de Ln^{3+} dans les types $La_2 Mo O_6$ et $Bi_2 Nb O_5 F$ avec une forme et une symétrie très proches du site 12e apporte une explication à l'existence de tels spectres qui pourraient être, en fait, dus à une émission de Eu^{3+} dans les 2 sites à la fois.

De plus l'activation du présumé site occupé, soit par l'ion trivalent, soit par l'ion divalent conduit à des spectres d'émission en luminescence cristalline identiques, ce qui est conforme à l'occupation commune d'un site ou même de deux par les ions Ln^{3+} et M^{2+} . Ce résultat est en accord avec nos conclusions concernant l'étude des domaines d'existence des phases et la luminescence cristalline.

E - INTENSITES

Ces résultats satisfaisants du point de vue symétrie des sites doivent être soumis à vérification en ce qui concerne l'intensité

des raies observées. Les intensités ont été calculées à partir de la formule suivante :

$$I = F.F \cdot Lp.m.D$$

où F = facteur de structure

$$Lp = \frac{1 + \cos^2 2\theta}{\sin^2 \theta \cos \theta} \quad \text{facteur de LORENTZ - polarisation}$$

m = multiplicité du plan considéré

$$D = e^{-B \frac{\sin^2 \theta}{\lambda^2}} \quad \text{facteur de température de DEBYE où B selon SUCHOW (94) peut être pris comme égal à 1,5.}$$

Le facteur de structure $F_{hkl} = \sum_j f_j A_j$ où f_j = facteur de diffusion atomique de l'ion occupant le site j ou facteur moyen si le site est occupé par plusieurs ions.

$$A_j = 8 \left\{ \cos 2\pi \left(lz_j + \frac{h+k}{4} \right) \left[\cos 2\pi \left(hx_j - \frac{k+1}{4} \right) \cos 2\pi \left(ky_j - \frac{h-1}{4} \right) + \cos 2\pi \left(hy_j + \frac{k+1}{4} \right) \cos 2\pi \left(kx_j + \frac{h+1}{4} \right) \right] + \cos 2\pi \left(lx_j + \frac{h+k}{4} \right) \left[\cos 2\pi \left(hy_j - \frac{k+1}{4} \right) \cos 2\pi \left(kz_j - \frac{h-1}{4} \right) + \cos 2\pi \left(hz_j + \frac{k+1}{4} \right) \cos 2\pi \left(ky_j + \frac{h+1}{4} \right) \right] + \cos 2\pi \left(ly_j + \frac{h+k}{4} \right) \left[\cos 2\pi \left(hz_j - \frac{k+1}{4} \right) \cos 2\pi \left(kx_j - \frac{h-1}{4} \right) + \cos 2\pi \left(hx_j + \frac{k+1}{4} \right) \cos 2\pi \left(kz_j + \frac{h+1}{4} \right) \right] \right\}$$

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau XXXIV qui donne aussi les distances inter-réticulaires observées et

calculées pour $\text{Cd Tm}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$. La complexité des calculs ne nous a pas permis d'effectuer un calcul complet mais tous les résultats obtenus sont bons et améliorés par rapport à la structure fluorine idéale dont les résultats sont donnés à titre de comparaison dans le tableau (XXXIV) ce que prouvent les facteurs de véracité obtenus (toutes les intensités observées pour $\text{Cd Tm}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$ Fig 29 ont été relevées à l'aide du compteur équipant le THETA 60 CC).

$$\text{Facteur de Véracité : } R = \frac{I_o - I_c}{I_o} \quad \begin{array}{l} I_o = \text{Intensité observée} \\ I_c = \text{Intensité calculée} \end{array}$$

(I) R calculé par rapport aux raies principales

- a) dans l'hypothèse d'une structure fluorine idéale groupe spatial $\text{Fm}\bar{3}\text{m}$ $R = 0,089$
- b) dans l'hypothèse d'une structure dérivée de la fluorine groupe spatial $\text{Pn}\bar{3}\text{n}$ $R = 0,018$

(II) R calculé par rapport à toutes les raies dans le groupe spatial $\text{Pn}\bar{3}\text{n}$ $R = 0,030$.

Il n'est pas possible de différencier les occupations (I) et (II) des sites 12e et 8c car les valeurs des intensités théoriques dans les deux cas ne sont différentes que pour les raies d'intensité très faible (raies de surstructure par rapport au groupe $\text{Fm}\bar{3}\text{m}$). Une étude en ce sens n'est possible que si l'on a plusieurs anticathodes à sa disposition. Les calculs permettent aussi d'expliquer pourquoi, dans le cas de $\text{Cd Y}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$, certaines intensités de petites raies sont totalement inversées par rapport à celles obtenues avec les autres terres rares.

TABLEAU XXXIV

Cd Tm ₄ Mo ₃ O ₁₆			a = 10,650 Å	
d _{exp}	d _{th}	I/I ₀ (exp)	I/I ₀ (th) par rapport à une structure fluorine idéale (Fm3m)	I/I ₀ (th) par rapport à une structure fluorine dérivée (Pn3n)
7,557	7,540	4,5		5,25 (I) 3,6 (II)
5,36 (MoKα)	5,325	~ 0 (CuKα)		0,1 (I) 0,8 (II)
4,35 (MoKα)	4,348	~ 0 (CuKα)		1,5 (I) 0,8 (II)
3,37 (MoKα)	3,368	~ 0 (CuKα)		0,9 (I) 0,6 (II)
3,074	3,074	100	100	100
2,852	2,846	1,5		1,8 (I) 1,1 (II)
2,6634	2,6625	31,8	28,2	32,4
2,5169	2,5102	0,5		0,75
2,3803	2,3814			
2,3247	2,3240	1,5		1,3
2,2706	2,2706	2,8		2
2,1740	2,1739			
2,0896	2,0886	2,5		2,25
1,9786	1,9776	0,75		0,75
1,9449	1,9444			
1,8834	1,8827	45,77	53,3	45,3
1,8280	1,8265	1		
1,8010	1,8002			

TABLEAU XXXIV (Suite)

Cd Tm ₄ Mo ₃ O ₁₆			a = 10,650 Å	
d _{exp}	d _{th}	I/I ₀ (exp)	I/I ₀ (th) par rapport à une structure fluorine idéale (Fm3m)	I/I ₀ (th) par rapport à une structure fluorine dérivée (Pn3n)
1,3530	1,3526	1		
1,3313	1,3313	5,28	6,5	5,04
1,3111	1,3109	0,5		
1,2919	1,2915			
1,2843	1,2821			
1,2567	1,2551			
1,2392	1,2380			
1,2295	1,2297			
1,2224	1,2216	15,50	14,5	14,5
1,2148	1,2137			
1,2068	1,2059			
1,1916	1,1907	11,66	8,7	11,8

TABLEAU XXXIV (Suite)

Cd Tm ₄ Mo ₃ O ₁₆				a = 10,650 Å	
	d _{exp}	d _{th}	I/I ₀ (exp)	I/I ₀ (th) par rapport à une structure fluorine idéale (Fm3m)	I/I ₀ (th) par rapport à une structure fluorine dérivée (Pn3n)
1					
1					
3	1,1774	1,1761			
0					
3	1,1680	1,1690			
1					
2	1,1629	1,1620			
5					
1	1,1489	1,1484			
1					
4	1,1362	1,1353			
2					
3					
0	1,1284	1,1290			
2					
4					
1	1,1231	1,1226			
0					
3					
2	1,0991	1,0985	0,5		
4	1,0876	1,0870	9,45	12,8	10,0
0					
3	1,0762	1,0758	0,5		
1					
0					
0	1,0654	1,0650			



F - CONCLUSION

L'hypothèse structurale suivant laquelle l'une des phases étudiées $\text{Cd Tm}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$ cristallise dans le système cubique avec pour groupe spatial $\text{Pn}\bar{3}\text{n}$ a été bâtie sur des résultats obtenus précédemment et donnés dans les paragraphes antérieurs et elle permet d'en expliquer certains autres. Les calculs théoriques des intensités de raies confirment les valeurs des intensités expérimentales et en particulier celles des raies les moins intenses, qui illustrent la différence entre les deux groupes spatiaux $\text{Fm}\bar{3}\text{m}$ et $\text{Pn}\bar{3}\text{n}$.

Un certain nombre de points restent encore à préciser ; à savoir le degré d'occupation relative des sites 8c et 12e par les ions Tm^{3+} et Cd^{2+} et sa relation avec les domaines d'existence des phases dont les différences sont certainement dues à l'écart variable entre les valeurs des rayons ioniques des ions Ln^{3+} et M^{2+} . Cette connaissance nous permettrait probablement d'expliquer la distorsion de certains sites (Infra Rouge).

Nous avons fixé les paramètres des sites selon des critères déjà mentionnés, mais il est évident qu'ils sont sujets à variation lorsque l'on passe de $\text{Cd Tm}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$ à une autre phase. Il est aussi possible que les structures de tous les composés préparés, apparemment isotypes si l'on examine leurs spectres de diffraction X, bien que dérivant de la structure type fluorine n'appartiennent pas toutes au groupe spatial $\text{Pn}\bar{3}\text{n}$ mais en soient très proches ce que seule une étude sur monocristaux pourrait peut être montrer.

CHAPITRE III

-:-:-:-

MODES OPERATOIRES

ET

TECHNIQUES D'ETUDE

I - PRODUITS UTILISES

--:--:--:--:--

A - PRODUITS COMMERCIALISES

L'oxyde MoO_3 que nous avons utilisé est un produit Prolabo I.P. ainsi que les autres oxydes des métaux divalents. Les oxydes de terres rares Ln_2O_3 sont des produits FLUKA ou PECHINEY à 99,9 % de pureté.

B - PRODUITS PREPARES

Ag_2MoO_4 et Ag_2WO_4 ont été obtenus par double décomposition en milieu aqueux suivant la méthode classique : mélange à chaud et à pH voisin de 9-10 d'une solution saturée de nitrate d'argent et d'une solution également saturée de molybdate ou de tungstate de Sodium. Le précipité obtenu, blanc, est lavé à l'eau puis séché sous vide. L'analyse montre qu'il s'agit bien de Ag_2MoO_4 ou Ag_2WO_4 à 99 %.

En ce qui concerne les phases fluorines on peut les obtenir à partir des trois oxydes de départ mais leur pureté et leur cristallinité sont bien supérieures si l'on part des deux composés Ln_2MoO_6 et MfO_2 .

Les molybdates de lanthanides Ln_2MoO_4 sont préparés à partir d'un mélange des oxydes MoO_3 et Ln_2O_3 en proportion 1:1 chauffé de 650 à 1000° pendant trois jours.

Remarque : Pour les préparations à l'état solide utilisant l'oxyde de molybdène MoO_3 et exigeant une température supérieure à 700° il est nécessaire d'effectuer un préchauffage autour de cette température car MoO_3 se sublime en quantité importante au voisinage de son point de fusion ($t = 797^\circ\text{C}$).

Les oxydes Pr_2O_3 et Tb_2O_3 ont été obtenus par réduction sous courant d'hydrogène à 900° pendant 2h de Pr_6O_{11} et Tb_4O_7 . Leur contrôle a été effectué par examen de leur spectre de diffraction des rayons X et par la mesure de leur susceptibilité magnétique.

Les molybdates $\text{M}^{\text{II}}\text{MoO}_4$ sont préparés par chauffage à 900°C de MoO_3 et de l'oxyde de Cadmium ou des carbonates de Calcium, Strontium, Baryum ou Plomb.

II - TECHNIQUES d'ETUDES

---:---:---:---:---:---:---:---

A - RADIOCRISTALLOGRAPHIE

Les diagrammes de poudre sont effectués avec un appareil C.G.R. dictyobloc, Têta 50 ou Têta 60 (pour les phases fluorines), à tube scellé Industrie AC 321 et à anticathode de cuivre. L'appareil est équipé d'un monochromateur à cristal de quartz courbe permettant de séparer les radiations parasites ($K\beta$ et $K\alpha_2$) et d'obtenir un foyer très fin. On utilise la radiation K_{α_1} de longueur $\lambda = 1,5405 \text{ \AA}$. Cet appareil est muni d'un dispositif d'enregistrement du nombre moyen d'impulsion reçues par un compteur GEIGER et MULLER placés à l'arrière du faisceau diffracté. Le diffractogramme ainsi obtenu permet de mesurer directement l'intensité relative des raies.

Pour déterminer les paramètres de maille avec la meilleure précision nous avons toujours utilisé un étalon interne (FeCl_3 , CaF_2 ou un composé du type scheelite CaMoO_4 ou SrWO_4 particulièrement appropriés pour la détermination des paramètres des phases fluorines.

L'erreur absolue moyenne du paramètre varie avec la cristallisation du produit mais elle n'est jamais inférieure à $0,002 \text{ \AA}$. La détermination des intensités relatives (I/I_0) des pics s'est faite soit par mesure des surfaces soit par comptage à l'aide du compteur à scintillations équipant le Têta 60. La précision de ces mesures est de l'ordre de 1 à 2 % dans le meilleur des cas, car même par comptage les résultats sont difficilement reproductibles.

B - ANALYSES THERMIQUES SIMPLE et DIFFERENTIELLE (A.T.S.) et (A.T.D.)

Les diagrammes sont établis à partir de la première courbe d'échauffement des mixtes préalablement chauffés à des températures variables selon les cas de façon à obtenir une réaction complète. Nous utilisons des appareils montés au laboratoire.

L'appareil d'analyse thermique simple se compose d'un thermocouple constitué d'une gaine de 5 mm de diamètre (en platine rhodié à 10 %) à l'intérieur de laquelle se trouve un fil de platine qui lui est soudé à son extrémité. Ce thermocouple plonge dans un creuset en platine pouvant contenir jusqu'à 100 g de produit.

La tête d'analyse thermique différentielle est constitué de deux couples en Pallaplat montés en opposition et d'un couple Pt/Pt-Rh 10 % repérant la température de l'ensemble. Chacun des couples en Pallaplat supporte un creuset en Platine pouvant contenir au maximum 100 mg de produit. Celui en Pt-Rh 10 % en soutient un contenant de l'alumine déshydratée.

Le four à régulation de température type ADAMTL permet d'atteindre 1250°C. Un enregistreur MLCI donne la courbe $T = f(\text{temps})$ pour l'A.T.S. et $\Delta T = f(\text{temps})$ pour l'A.T.D. Un millivoltmètre relié au couple Pt/Pt-Rh 10 % permet de suivre la température de l'ensemble.

La vitesse de chauffe est en général fixée à 400°C/h. La précision sur la température n'est pas supérieure à 5°C pour l'A.T.S. et l'A.T.D.

C - THERMOGRAVIMÉTRIE

Les études thermogravimétriques sont réalisées à l'air à l'aide d'une therobalance ADAMEL type TH 59. La vitesse de montée en température est généralement de 60°/h.

D - MASSE VOLUMIQUE

Elle est mesurée par pycnométrie dans le phtalate de butyle. Le dégazage du produit est de deux heures. L'erreur absolue sur la moyenne des mesures est de l'ordre de $\pm 0,05 \text{ g/cm}^3$.

E - SPECTROMÉTRIE INFRA-ROUGE *

Les spectres sont obtenus par la technique du pastillage avec KBr (la concentration du produit étudié est de l'ordre de 1 %). L'appareil utilisé est un PERKIN ELMER type 337 (Zone d'utilisation 25 à 2,5).

F - MESURES MAGNÉTIQUES

Les susceptibilités magnétiques ont été mesurées par la méthode de FARADAY. L'échantillon est suspendu à un bras d'une balance ME type H 16. (sensibilité 0,00001 g) et il est soumis à un champ magnétique inhomogène produit par un électro-aimant. Un cryostat à azote liquide ou un four permettant une régulation de la température peut être logé entre les pièces polaires de l'électro-aimant. On peut ainsi opérer entre 77 et 700°K.

* Nous remercions vivement Monsieur le Professeur SILBER dans le laboratoire duquel les spectres Infra-Rouge ont été réalisés.

G - ENLEVE OPTIQUE des PRODUITS LUMINESCENTS
(SPECTRES d'EMISSION)

DISPOSITIF EXPERIMENTAL : Il comprend les organes suivants :

1°) Support de la substance (Fig 35)

C'est un vase de D'WAL en verre pyrex à double enveloppe qui permet l'étude du spectre d'émission à des températures comprises entre $- 196^{\circ}$ et $+ 300^{\circ}$ C.

2°) Source excitatrice de la luminescence

Le produit peut être excité au moyen de l'une des deux sources suivantes :


- une lampe de WOOD transmettant principalement la radiation $3650 \text{ \AA}$ du mercure
- une lampe à vapeur de mercure sous basse pression à enveloppe de quartz. L'émission est alors constituée essentiellement par la raie $= 2537 \text{ \AA}$.

3°) Dispositif récepteur

Le rayonnement visible émis par le phosphore est focalisé sur la fente d'entrée d'un monochromateur HILGER à la sortie duquel se trouve un photomultiplicateur du type XP 1002 de la Société Radiotechnique relié à un microampèremètre. Ce récepteur a été étalonné en énergie à l'aide d'une lampe Hazda de 500 watts.

Les mesures effectuées étant des mesures relatives, les énergies seront toujours exprimées en unités arbitraires.

Coupe A.A



P: Pynex


Th: Thermocouple

C: Cuivre

e: Echantillon

Q: Glaces de quartz

Coupe B.B



R E S U M E E T C O N C L U S I O N

Figure 1. The 100 most cited articles in the field of the use of the Internet in the classroom. The figure shows a horizontal bar chart with 100 bars, each representing an article. The bars are arranged in descending order of citation count. The first bar is the longest, representing the most cited article, and the bars decrease in length as the citation count decreases. The bars are labeled with the first few letters of the author's name and the year of publication.

L'étude des diagrammes d'équilibre liquides-solides de quelques binaires a permis d'apporter une contribution à leur connaissance

- MoO_3 - CuO .

Nous avons retrouvé certains résultats publiés antérieurement et mis en évidence par trempe de CuMoO_4 une phase hexagonale de composition CuMoO_{4-x} ($0 \leq x \leq 0,5$). De plus il existe une phase non stoechiométrique, phase β , dont le domaine d'existence est très probablement compris entre $\text{Cu}_3\text{Mo}_2\text{O}_9$ et Cu_2MoO_5 ; nous proposons des paramètres et une indexation pour la composition $\text{Cu}_3\text{Mo}_2\text{O}_9$. Une étude plus générale du système Mo - Cu - O reste à entreprendre.

- MoO_3 - ZnO .

Nous avons tracé le diagramme et mis en évidence le composé $\text{Zr}_3\text{Mo}_2\text{O}_9$.

- MoO_3 - Ag_2MoO_4 et WO_3 - Ag_2WO_4 .

Nous avons préparé une phase Ag_2MoO_4 cristallisant dans le système quadratique, tracé pour la première fois les diagrammes d'équilibres correspondants et mis en évidence les deux composés $\text{Ag}_2\text{M}_4\text{O}_{13}$ et $\text{Ag}_2\text{M}_2\text{O}_7$ où M = Mo ; W.

Nous avons ensuite étudié dans l'état solide le système WO_3 - CuO et avons trouvé, outre CuWO_4 déjà connu, une phase nouvelle Cu_3WO_6 .

Une étude à 800° du ternaire MoO_3 - WO_3 - CuO ne manifeste que les phases révélées par les systèmes binaires.

Le chapitre II est consacré aux composés obtenus par réaction entre les molybdates de Lanthanides Ln_2MoO_6 et des phases du type scheelite MMoO_4 .

Ces composés ont des formules moléculaires globales $\text{MLn}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$ et $\text{MLn}_6\text{Mo}_4\text{O}_{22}$ avec des nombres de molécules par maille Z égaux respectivement à 4 et à 2,91.

Quelques substitutions ont été réalisées, mais notre travail s'est surtout porté sur l'étude structurale de ces composés qui ont une structure très proche du type Fluorine (groupe spatial $\text{Fm}\bar{3}\text{m}$).

En l'absence de monocristaux nos hypothèses structurales se sont appuyées sur les études du spectre optique de l'ion Eu^{3+} , employé comme activateur dans certains de nos composés et des spectres d'absorption Infra-Rouge obtenus entre 400 et 4 000 cm^{-1} .

Ces résultats joints à une étude poussée des spectres de diffraction X nous ont conduit à proposer le groupe spatial $\text{Pn}\bar{3}\text{n}$ pour le composé $\text{CdTm}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$.

L'hypothèse du groupe spatial $\text{Pn}\bar{3}\text{n}$ ainsi que la nature des entourages de certains ions (Mo^{6+} a un entourage MoO_4 de symétrie S_4 comme dans La_2MoO_6 et la Scheelite ; Tm^{3+} a, pour un de ses sites, le même entourage à huit oxygènes que dans Tm_2MoO_6) nous a permis de placer les ions, de calculer les distances anion-cation et de trouver un facteur de véracité, non calculé sur toutes les raies, de 0,03 ce qui est exceptionnel pour un spectre de poudre.

Bien des points restent encore à préciser et nous envisageons, en l'absence de monocristaux que nous essaierons néanmoins d'obtenir, une étude des microcristaux par microscopie électronique afin d'étayer nos hypothèses structurales et avec l'espoir de confirmer le groupe spatial proposé.

Nous aimerions également déterminer les différents facteurs qui influent sur la nature des domaines d'existence. Il serait intéressant d'établir la réaction de topotaxie génératrice de ces composés. En effet ils ont une structure d'un type dérivé de la fluorine que nous appelons "par compensation" puisque certains sites existant dans les composés générateurs se conservent au cours de la réaction et se retrouvent donc dans nos phases.

D I F F R A C T O G R A M M E S

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Cd La ₄ Mo ₃ O ₁₆						
a = (11,114 ± 0,002) Å d ₄ ²² = 5,80 Z = 4						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
2 2 2	:	3,207	:	3,208	:	100
3 2 1	:	2,966	:	2,966	:	2
4 0 0	:	2,7776	:	2,7785	:	37
4 2 1	:	2,4249	:	2,4253	:	3
3 3 2	:	2,3600	:	2,3695	:	4
4 3 1	:	2,1791	:	2,1796	:	4
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0606	:	2,0638	:	3
4 4 0	:	1,9632	:	1,9647	:	50
5 3 0	:	1,9050	:	1,9060	:	2
4 3 3	:		:		:	
5 4 1	:	1,7110	:	1,7152	:	2
6 2 2	:	1,6766	:	1,6755	:	46
4 4 4	:	1,6040	:	1,6041	:	12
8 0 0	:	1,3890	:	1,3892	:	9
6 6 2	:	1,2755	:	1,2749	:	28
8 4 0	:	1,2427	:	1,2426	:	24
8 4 4	:	1,1347	:	1,1343	:	16
	:		:		:	
	:		:		:	

Cd Ce ₄ Mo ₃ O ₁₆						
a = (11,070 ± 0,002) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,195	:	3,195	:	100
3 2 1	:	2,947	:	2,958	:	3
4 0 0	:	2,764	:	2,767	:	38
4 2 1	:	2,4149	:	2,4156	:	3
3 3 2	:	2,3599	:	2,3601	:	4
4 3 1	:	2,1740	:	2,1710	:	5
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0561	:	2,0556	:	3
4 4 0	:	1,9568	:	1,9569	:	56
6 2 2	:	1,6703	:	1,6688	:	49
4 4 4	:	1,5984	:	1,5978	:	14
5 5 2	:		:		:	
6 3 3	:	1,5087	:	1,5064	:	2
7 2 1	:		:		:	
6 5 1	:	1,4066	:	1,4058	:	2
7 3 2	:		:		:	
8 0 0	:	1,3846	:	1,3837	:	9
5 5 4	:		:		:	
7 4 1	:	1,3633	:	1,3626	:	2
8 1 1	:		:		:	
6 6 2	:	1,2703	:	1,2698	:	21
8 4 0	:	1,2376	:	1,2376	:	19
8 4 4	:	1,1305	:	1,1298	:	15
	:		:		:	
	:		:		:	

Cd Pr ₄ Mo ₃ O ₁₆						
a = (11,031 ± 0,002) Å						
h k l	:	d _{exp} (^o Å)	:	a _{th} (^o Å)	:	I/I
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,184	:	3,184	:	100
3 2 1	:	2,920	:	2,948	:	5
4 0 0	:	2,756	:	2,757	:	42
4 2 1	:	2,4111	:	2,4071	:	5
3 3 2	:	2,3563	:	2,3518	:	5
4 3 1	:	2,1670	:	2,1633	:	6
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0517	:	2,0484	:	4
4 4 0	:	1,9489	:	1,9500	:	59
6 2 2	:	1,6653	:	1,6629	:	49
4 4 4	:	1,5938	:	1,5921	:	20
8 0 0	:	1,3802	:	1,3788	:	11
6 6 2	:	1,2668	:	1,2653	:	20
8 4 0	:	1,2346	:	1,2333	:	19
	:		:		:	
	:		:		:	

Cd Na ₄ Mo ₃ O ₁₆						
a = (10,960 ± 0,002) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,162	:	3,163	:	100
3 2 1	:	2,919	:	2,929	:	3
4 0 0	:	2,740	:	2,740	:	37
4 2 1	:	2,3901	:	2,3916	:	3
3 3 2	:	2,3363	:	2,3366	:	5
4 3 1	:	2,1542	:	2,1494	:	5
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0342	:	2,0352	:	3
4 4 0	:	1,9355	:	1,9374	:	54
6 2 2	:	1,6515	:	1,6522	:	46
4 4 4	:	1,5813	:	1,5819	:	16
8 0 0	:	1,3687	:	1,3700	:	11
6 6 2	:	1,2581	:	1,2571	:	25
8 4 0	:	1,2265	:	1,2253	:	19
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	

Cd Sn ₄ Mo ₃ C ₁₆						
a = (10,894 ± 0,004) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,142	:	3,144	:	100
3 2 1	:	2,913	:	2,911	:	2
4 0 0	:	2,723	:	2,723	:	33
4 2 1	:	2,3779	:	2,3772	:	1
3 3 2	:	2,3247	:	2,3226	:	4
4 3 1	:	2,1357	:	2,1364	:	4
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0213	:	2,0229	:	3
4 4 0	:	1,9247	:	1,9258	:	50
5 4 1	:	1,6802	:	1,6810	:	2
6 2 2	:	1,6428	:	1,6423	:	43
4 4 4	:	1,5725	:	1,5724	:	15
8 0 0	:	1,3618	:	1,3617	:	7
6 6 2	:	1,2505	:	1,2496	:	21
8 4 0	:	1,2187	:	1,2179	:	19
8 4 4	:	1,1119	:	1,1118	:	16
	:		:		:	
	:		:		:	

CdTh ₄ Mo ₃ O ₁₆						
$a = (10,95 \pm 0,01) \text{ \AA}$						
h k l	:	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	:	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	:	I/I
2 2 2	:	3,133	:	3,132	:	100
4 0 0	:	2,7104	:	2,7125	:	38
4 4 0	:	1,9163	:	1,9180	:	53
6 2 2	:	1,6327	:	1,6357	:	39
4 4 4	:	1,5642	:	1,5661	:	13
8 0 0	:	1,3535	:	1,3563	:	8
6 6 2	:	1,2141	:	1,2126	:	18
8 4 0	:	1,2122	:	1,2131	:	16

Cd Gd ₄ Mo ₃ O ₁₆						
a = (10,835 ± 0,005) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,129	:	3,128	:	100
3 2 1	:	2,909	:	2,896	:	4
4 0 0	:	2,707	:	2,708	:	40
4 2 1	:	2,3718	:	2,3644	:	4
3 3 2	:	2,3132	:	2,3100	:	6
4 3 1	:	2,1252	:	2,1249	:	6
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0170	:	2,0120	:	4
4 4 0	:	1,9163	:	1,9154	:	67
5 3 0	:	1,8681	:	1,8582	:	2
4 3 3	:		:		:	
5 4 1	:	1,6709	:	1,6719	:	2
6 2 2	:	1,6343	:	1,6334	:	57
4 4 4	:	1,5632	:	1,5639	:	15
5 5 2	:		:		:	
6 3 3	:	1,4762	:	1,4745	:	3
7 2 1	:		:		:	
6 5 1	:	1,3810	:	1,3760	:	3
7 3 2	:		:		:	
8 0 0	:	1,3531	:	1,3544	:	9
5 5 4	:		:		:	
7 4 1	:	1,3313	:	1,3337	:	2
8 1 1	:		:		:	
6 6 2	:	1,2435	:	1,2429	:	20
8 4 0	:	1,2112	:	1,2114	:	17
8 4 4	:	1,1069	:	1,1058	:	13
	:		:		:	
	:		:		:	

Cd Tb ₄ Mo ₃ O ₁₆						
$a = (10,788 \pm 0,00?) \text{ \AA}$						
h k l	:	d _{exp} ($\text{\AA}$)	:	d _{th} ($\text{\AA}$)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,114	:	3,114	:	100
3 2 1	:	2,877	:	2,883	:	3
4 0 0	:	2,696	:	2,6970	:	34
4 2 1	:	2,3539	:	2,3541	:	3
3 3 2	:	2,3006	:	2,3000	:	5
4 3 1	:	2,1128	:	2,1157	:	5
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0035	:	2,0033	:	3
4 4 0	:	1,9065	:	1,9071	:	45
5 3 0	:	1,8567	:	1,8501	:	2
4 3 3	:		:		:	
5 4 1	:	1,6681	:	1,6646	:	2
6 2 2	:	1,6252	:	1,6264	:	40
4 4 4	:	1,5551	:	1,5571	:	10
5 5 2	:		:		:	
6 3 3	:	1,4658	:	1,4680	:	2
7 2 1	:		:		:	
6 5 1	:	1,3721	:	1,3701	:	2
7 3 2	:		:		:	
8 0 0	:	1,3463	:	1,3485	:	7
5 5 4	:		:		:	
7 4 1	:	1,3264	:	1,3279	:	1
8 1 1	:		:		:	
6 6 2	:	1,2365	:	1,2375	:	16
8 4 0	:	1,2072	:	1,2061	:	13
	:		:		:	



Cd Dy ₄ Mo ₃ O ₁₆						
a = (10,746 ± 0,002) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,102	:	3,102	:	100
4 0 0	:	2,6883	:	2,6865	:	38
4 2 1	:	2,3430	:	2,3450	:	3
3 3 2	:	2,3000	:	2,2911	:	5
4 3 1	:	2,1056	:	2,1075	:	6
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0010	:	1,9955	:	2
4 4 0	:	1,9020	:	1,8996	:	55
6 2 2	:	1,6200	:	1,6200	:	50
4 4 4	:	1,5490	:	1,5510	:	12
8 0 0	:	1,3429	:	1,3433	:	7
6 6 2	:	1,2314	:	1,2326	:	20
8 4 0	:	1,1996	:	1,2014	:	14
8 4 4	:	1,0960	:	1,0968	:	14
	:		:		:	
	:		:		:	

Cd Ho ₄ Mo ₃ C ₁₆						
a = (10,726 ± 0,002) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,091	:	3,096	:	100
3 2 1	:	2,865	:	2,867	:	1
4 0 0	:	2,6789	:	2,6815	:	34
4 2 1	:	2,3399	:	2,3406	:	3
3 3 2	:	2,2828	:	2,2868	:	3
4 3 1	:	2,1008	:	2,1035	:	3
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	1,9894	:	1,9918	:	2
4 4 0	:	1,8931	:	1,8961	:	51
5 3 0	:	1,8372	:	1,8395	:	1
4 3 3	:		:		:	
5 4 1	:	1,6532	:	1,6551	:	1
6 2 2	:	1,6133	:	1,6170	:	42
4 4 4	:	1,5457	:	1,5482	:	12
5 5 2	:		:		:	
6 3 3	:	1,4576	:	1,4596	:	2
7 2 1	:		:		:	
6 5 1	:	1,3612	:	1,3622	:	2
7 3 2	:		:		:	
8 0 0	:	1,3402	:	1,3407	:	7
5 5 4	:		:		:	
7 4 1	:	1,3235	:	1,3203	:	1
8 1 1	:		:		:	
6 6 2	:	1,2309	:	1,2304	:	15
8 4 0	:	1,1996	:	1,1992	:	13
8 4 4	:	1,0955	:	1,0947	:	11
6 6 6	:	1,0318	:	1,0317	:	14
	:		:		:	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS


THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Cd Er ₄ Mo ₃ O ₁₆						
a = (10,690 ± 0,002) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,087	:	3,086	:	100
3 2 1	:	2,855	:	2,857	:	2
4 0 0	:	2,6744	:	2,6725	:	33
4 2 1	:	2,3315	:	2,3327	:	2
3 3 2	:	2,2783	:	2,2791	:	4
4 3 1	:	2,0979	:	2,0965	:	4
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	1,9902	:	1,9851	:	2
4 4 0	:	1,8890	:	1,8897	:	50
5 3 0	:		:		:	
4 3 3	:	1,8329	:	1,8333	:	1
5 4 1	:	1,6461	:	1,6495	:	1
6 2 2	:	1,6101	:	1,6116	:	42
4 4 4	:	1,5419	:	1,5429	:	11
5 5 2	:		:		:	
6 3 3	:	1,4543	:	1,4547	:	2
7 2 1	:		:		:	
6 5 1	:	1,3565	:	1,3576	:	2
7 3 2	:		:		:	
8 0 0	:	1,3356	:	1,3362	:	7
5 5 4	:		:		:	
7 4 1	:	1,3164	:	1,3158	:	1
8 1 1	:		:		:	
6 6 2	:	1,2252	:	1,2262	:	16
8 4 0	:	1,1948	:	1,1952	:	13
8 4 4	:	1,0908	:	1,0910	:	11
	:		:		:	
	:		:		:	

Cd Yb ₄ Mo ₃ O ₁₆						
a = (10,624 ± 0,002) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,068	:	3,067	:	100
3 2 1	:	2,839	:	2,839	:	3
4 0 0	:	2,6558	:	2,6560	:	40
3 3 0	:	2,5020	:	2,5041	:	1
4 1 1	:		:		:	
4 2 1	:	2,3155	:	2,3183	:	2
3 3 2	:	2,2728	:	2,2650	:	5
4 3 1	:	2,0822	:	2,0835	:	5
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	1,9713	:	1,9728	:	2
4 4 0	:	1,8761	:	1,8784	:	60
5 3 0	:	1,8216	:	1,8220	:	2
4 3 3	:		:		:	
5 4 1	:	1,6378	:	1,6393	:	2
6 2 2	:	1,6010	:	1,6016	:	55
4 4 4	:	1,5330	:	1,5334	:	13
5 5 2	:		:		:	
6 3 3	:	1,4455	:	1,4457	:	3
7 2 1	:		:		:	
6 5 1	:	1,3476	:	1,3492	:	2
7 3 2	:		:		:	
8 0 0	:	1,3274	:	1,3280	:	8
5 5 4	:		:		:	
7 4 1	:	1,3100	:	1,3077	:	2
8 1 1	:		:		:	
6 6 2	:	1,2187	:	1,2186	:	21
8 4 0	:	1,1879	:	1,1878	:	18
8 4 4	:	1,0845	:	1,0843	:	16
	:		:		:	
	:		:		:	

Cd Y ₄ Mo ₃ O ₁₆						
a = (10,716 ± 0,002) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 1 1	:	4,431	:	4,374	:	2
3 1 0	:	3,386	:	3,388	:	2
2 2 2	:	3,100	:	3,093	:	100
4 0 0	:	2,6820	:	2,6790	:	31
3 3 0	:	2,5260	:	2,5258	:	1
4 1 1	:		:		:	
4 2 1	:	2,3362	:	2,3384	:	4
3 3 2	:	2,2855	:	2,2847	:	2
4 3 1	:		:		:	
5 1 0	:	2,1023	:	2,1016	:	2
4 3 2	:	1,9879	:	1,9899	:	3
4 4 0	:	1,8938	:	1,8943	:	53
6 2 2	:	1,6153	:	1,6155	:	41
4 4 4	:	1,5471	:	1,5467	:	10
5 5 2	:		:		:	
6 3 3	:	1,4581	:	1,4583	:	2
7 2 1	:		:		:	
6 5 1	:		:		:	
7 3 2	:	1,3626	:	1,3609	:	2
8 0 0	:	1,3395	:	1,3395	:	7
5 5 4	:		:		:	
7 4 1	:	1,3192	:	1,3190	:	2
8 1 1	:		:		:	
7 4 3	:		:		:	
8 3 1	:	1,2465	:	1,2457	:	2
6 6 2	:	1,2279	:	1,2292	:	16
8 4 0	:	1,1975	:	1,1981	:	13
8 4 4	:	1,0932	:	1,0937	:	10
	:		:		:	
	:		:		:	



$$a = (11,210 \pm 0,005) \text{ \AA}$$

$$d_{\frac{2}{4}} = 5,60$$

$$Z = 2,90$$

h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	I/I ₀
2 2 2	3,234	3,236	100
3 2 1	2,996	2,996	2
4 0 0	2,8031	2,8025	35
4 2 1	2,4441	2,4462	4
3 3 2	2,3877	2,3900	4
4 3 1	2,1970	2,1984	5
5 1 0			
4 3 2	2,0795	2,0816	3
4 4 0	1,9828	1,9817	55
6 2 2	1,6897	1,6899	52
4 4 4	1,6174	1,6180	13
5 5 2			
6 3 3	1,5252	1,5255	1
7 2 1			
6 5 1			
7 3 2	1,4230	1,4237	2
8 0 0	1,4010	1,4013	9
5 5 4			
7 4 1	1,3806	1,3799	3
8 1 1			
6 6 2	1,2853	1,2859	23
8 4 0	1,2539	1,2533	19




$$a = (11,220 \pm 0,005) \text{ \AA}$$


h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	I/I ₀
2 2 2	3,236	3,239	100
4 0 0	2,803	2,805	38
4 2 1	2,444	2,448	4
3 3 2	2,3967	2,3921	3
4 3 1	2,1994	2,2004	5
5 1 0			
4 3 2	2,0786	2,0835	5
4 4 0	1,9836	1,9834	66
6 2 2	1,6909	1,6915	64
4 4 4	1,6005	1,6195	16
8 0 0	1,4025	1,4025	11
6 6 2	1,2873	1,2870	26
8 4 0	1,2531	1,2531	23

Ca Pr ₆ Mo ₄ O ₂₂						
a = (11,08 ± 0,01) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,198	:	3,198	:	100
3 2 1	:	2,957	:	2,961	:	4
4 0 0	:	2,769	:	2,770	:	32
3 3 0	:		:		:	
4 1 1	:	2,6121	:	2,6115	:	2
	:		:		:	
4 2 0	:	2,4793	:	2,4775	:	1
4 2 1	:	2,4149	:	2,4178	:	3
	:		:		:	
3 3 2	:	2,3599	:	2,3622	:	4
	:		:		:	
4 3 1	:		:		:	
5 1 0	:	2,1741	:	2,1729	:	4
	:		:		:	
4 3 2	:	2,0562	:	2,0575	:	3
	:		:		:	
4 4 0	:	1,9584	:	1,9586	:	60
	:		:		:	
5 3 0	:		:		:	
4 3 3	:	1,9049	:	1,9002	:	2
	:		:		:	
5 4 1	:	1,7085	:	1,7099	:	2
	:		:		:	
6 2 2	:	1,6692	:	1,6703	:	45
	:		:		:	
4 4 4	:	1,5989	:	1,5992	:	15
	:		:		:	
5 5 2	:		:		:	
6 3 3	:	1,5109	:	1,5077	:	2
7 2 1	:		:		:	
	:		:		:	
6 5 1	:		:		:	
7 3 2	:	1,4086	:	1,4071	:	2
	:		:		:	
8 0 0	:	1,3828	:	1,3850	:	8
	:		:		:	
6 6 2	:	1,2682	:	1,2709	:	25
	:		:		:	
8 4 0	:	1,2373	:	1,2388	:	22
	:		:		:	
	:		:		:	





h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	I/I ₀
2 2 2	3,177	3,176	100
4 0 0	2,750	2,750	30
4 2 1	2,402	2,401	3
3 3 2	2,3421	2,3458	5
4 3 1	2,1571	2,1578	5
5 1 0			
4 3 2	2,0385	2,0432	3
4 4 0	1,9457	1,9450	65
6 2 2	1,6590	1,6587	58
4 4 4	1,5887	1,5881	13
8 0 0	1,3757	1,3753	11
6 6 2	1,2624	1,2621	31
8 4 0	1,2290	1,2301	28
8 2 4	1,1231	1,1229	29




h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	I/I ₀
2 2 2	3,173	3,177	100
4 0 0	2,752	2,752	35
4 2 1	2,400	2,402	3
3 3 2	2,3515	2,3469	3
4 3 1	2,1591	2,1588	5
5 1 0			
4 3 2	2,0429	2,0441	5
4 4 0	1,9457	1,9459	60
6 2 2	1,6587	1,6595	57
4 4 4	1,5887	1,5888	2
8 0 0	1,3774	1,3760	10
6 6 2	1,2624	1,2627	26
8 4 0	1,2319	1,2307	23



Ca Sm ₆ Mo ₄ O ₂₀						
a = (10,916 ± 0,005) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,151	:	3,151	:	100
3 2 1	:	2,919	:	2,917	:	1
4 0 0	:	2,728	:	2,729	:	30
4 2 1	:	2,3840	:	2,3820	:	5
3 3 2	:	2,3305	:	2,3272	:	5
4 3 1	:	2,1445	:	2,1408	:	5
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0299	:	2,0270	:	3
4 4 0	:	1,9316	:	1,9296	:	50
6 2 2	:	1,6461	:	1,6456	:	50
4 4 4	:	1,5749	:	1,5755	:	25
8 0 0	:	1,3652	:	1,3645	:	11
6 6 2	:	1,2525	:	1,2521	:	30
8 4 0	:	1,2200	:	1,2204	:	28
8 4 4	:	1,1139	:	1,1141	:	25
	:		:		:	

$\text{Ca}_2\text{Eu}_6\text{Po}_3\text{W}_{22}$ $a = (10,77 \pm 0,01) \text{ \AA}$				$\text{Ca}_2\text{Eu}_6\text{Po}_3\text{W}_{22}$ $a = (10,795 \pm 0,005) \text{ \AA}$			
h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	I/I ₀	h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	I/I ₀
0 0 2	3,110	3,109	100	0 0 2	3,115	3,116	100
2 0 0	2,701	2,693	33	4 0 0	2,696	2,699	30
1 4 0	1,9040	1,9039	48	4 4 0	1,9090	1,9083	49
6 0 0	1,6075	1,6037	13	6 0 0	1,6071	1,6074	45
4 4 4	1,5555	1,5555	22	4 4 4	1,5586	1,5581	20
8 0 0	1,3451	1,3453	6	8 0 0	1,3469	1,3494	14
6 6 0	1,3358	1,3350	28	6 6 0	1,3370	1,3383	21
8 4 0	1,3005	1,3011	25	8 4 0	1,3075	1,3069	20

$\text{CaGa}_6\text{Te}_4\text{O}_{12}$ $a = (10,842 \pm 0,005) \text{ \AA}$					$\text{CaGa}_6\text{Te}_4\text{O}_{12}$ $a = (10,845 \pm 0,005) \text{ \AA}$				
h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$		I/I ₀	h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$		I/I ₀
2 2 2	3,129	3,130		100	2 2 2	3,128	3,130		100
4 0 0	2,710	2,710		25	4 0 0	2,713	2,711		28
4 4 0	1,9163	1,9160		55	4 4 0	1,9183	1,9171		58
6 2 2	1,6343	1,6345		40	6 2 2	1,6296	1,6349		35
4 4 4	1,5642	1,5649		14	4 4 4	1,5637	1,5653		15
8 0 0	1,3548	1,3550		7	8 0 0	1,3570	1,3556		8
6 6 0	1,2441	1,2437		25	6 6 0	1,2448	1,2440		22
8 4 0	1,2122	1,2110		21	8 4 0	1,2126	1,2125		18



$$a = (11,760 \pm 0,05) \text{ \AA}$$

$$c_{24} = 5,67 \quad \beta = 2,90$$

h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	I/I ₀	h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	I/I ₀
2 2 2	3,252	3,250	100	2 2 2	3,256	3,250	100
3 2 1	3,007	3,009	2	4 0 0	2,827	2,822	34
4 0 0	2,812	2,815	30	4 2 1	2,460	2,463	2
4 2 1	2,4530	2,4571	3	3 3 2	2,410	2,4070	2
3 3 2	2,3987	2,4006	2	4 3 1	2,2120	2,2141	4
4 3 1	2,2077	2,2082	4	5 1 0	2,0933	2,0965	2
5 1 0	2,0923	2,0909	2	4 3 2	2,0002	1,9958	51
4 3 2	1,9919	1,9909	51	4 4 0	1,7025	1,7020	49
4 4 0	1,7336	1,7375	2	6 2 2	1,6300	1,6295	18
5 4 1	1,6979	1,6975	45	8 0 0	1,4105	1,4112	10
6 2 2	1,6247	1,6258	14	6 6 2	1,2934	1,2950	25
4 4 4	1,5312	1,5322	2	8 4 0	1,2610	1,2622	19
5 5 2							
6 3 3							
7 2 1							
6 5 1	1,4316	1,4301	1				
7 3 2							
8 0 0	1,4067	1,4075	7				
6 6 2	1,2918	1,2916	22				
8 4 0	1,2591	1,2589	16				




$$a = (11,290 \pm 0,005) \text{ \AA}$$

Sr Pr ₆ Mo ₄ O ₂₂						
a = (11,11 ± 0,01) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
2 2 2	:	3,205	:	3,207	:	100
4 0 0	:	2,778	:	2,777	:	27
4 2 1	:	2,427	:	2,424	:	4
3 3 2	:	2,3658	:	2,3686	:	4
4 3 1	:	2,1791	:	2,1788	:	6
5 1 0	:	2,0606	:	2,0630	:	2
4 3 2	:	1,9648	:	1,9639	:	39
4 4 0	:	1,6772	:	1,6748	:	41
6 2 2	:	1,6050	:	1,6035	:	12
4 4 4	:	1,3882	:	1,3887	:	7
8 0 0	:	1,2740	:	1,2744	:	20
6 6 2	:	1,2419	:	1,2421	:	19
8 4 0	:		:		:	



$$a = (11,048 \pm 0,005) \text{ \AA}$$

h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	I/I ₀	h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	I/I ₀
2 2 2	3,192	3,189	100	2 2 2	3,188	3,188	100
4 0 0	2,759	2,762	29	4 0 0	2,761	2,761	23
4 2 1	2,405	2,410	2	4 4 0	1,9497	1,9523	51
3 3 2	2,3590	2,3554	3	6 2 2	1,6642	1,6649	38
4 3 1	2,1690	2,1666	5	4 4 4	1,5938	1,5940	12
5 1 0				8 0 0	1,3800	1,3805	7
4 3 2	2,0561	2,0515	3	6 6 2	1,2665	1,2668	19
4 4 0	1,9529	1,9530	47	8 4 0	1,2341	1,2347	18
6 2 2	1,6670	1,6655	44				
4 4 4	1,5964	1,5946	13				
8 0 0	1,3828	1,3810	8				
6 6 2	1,2679	1,2672	27				
8 4 0	1,2360	1,2352	20				
8 4 4	1,1284	1,1275	10				



$$a = (11,044 \pm 0,005) \text{ \AA}$$

Sr Sm ₆ Mo ₄ C ₂₂						
a = (10,95 ± 0,01) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
2 2 2	:	3,162	:	3,160	:	100
4 0 0	:	2,735	:	2,737	:	42
4 4 0	:	1,9371	:	1,9357	:	55
6 2 2	:	1,6515	:	1,6507	:	58
4 4 4	:	1,5813	:	1,5804	:	14
8 0 0	:	1,3687	:	1,3687	:	9
6 6 2	:	1,2559	:	1,2560	:	27
8 4 0	:	1,2252	:	1,2242	:	23

$\text{Sr Eu}_6 \text{Mo}_4 \text{O}_{22}$
 $a = (10,79 \pm 0,01) \text{ \AA}$

$\text{Sr Eu}_6 \text{Mo}_4 \text{O}_{22}$ $a = (10,79 \pm 0,01) \text{ \AA}$				$\text{Sr Eu}_6 \text{Mo}_3 \text{W O}_{22}$ $a = (10,79 \pm 0,01) \text{ \AA}$			
h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	I/I ₀	h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	I/I ₀
2 2 2	3,112	3,115	100	2 2 2	3,108	3,115	100
4 0 0	2,695	2,698	32	4 0 0	2,709	2,698	32
4 4 0	1,9025	1,9074	50	4 4 0	1,9090	1,9074	49
6 2 2	1,6310	1,6266	42	6 2 2	1,6260	1,6266	43
4 4 4	1,5596	1,5574	23	4 4 4	1,5570	1,5574	23
8 0 0	1,3485	1,3487	12	8 0 0	1,3452	1,3487	14
6 6 2	1,2350	1,2377	25	6 6 2	1,2368	1,2377	25
8 4 0	1,2075	1,2064	22	8 4 0	1,2039	1,2064	19

Pb La ₄ Mo ₃ O ₁₆						
a = (11,291 ± 0,002) Å		d ₁₁ ²² = 5,98		Z = 4		
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,265	:	3,259	:	100
4 0 0	:	2,822	:	2,822	:	26
4 2 1	:	2,460	:	2,463	:	3
3 3 2	:	2,4050	:	2,4072	:	3
4 3 1	:	2,2140	:	2,2143	:	3
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0950	:	2,0966	:	4
4 4 0	:	1,9960	:	1,9959	:	51
6 2 2	:	1,7025	:	1,7021	:	36
4 4 4	:	1,6300	:	1,6297	:	15
8 0 0	:	1,4105	:	1,4113	:	7
6 6 2	:	1,2949	:	1,2951	:	25
8 4 0	:	1,2610	:	1,2623	:	19
	:		:		:	

Pb Pr ₄ Mo ₃ O ₁₆						
a = (11,14 ± 0,01) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,219	:	3,215	:	100
3 2 1	:	2,976	:	2,977	:	3
4 0 0	:	2,786	:	2,785	:	28
4 2 1	:	2,4338	:	2,4309	:	3
3 3 2	:	2,3779	:	2,3750	:	4
4 3 1	:	2,1892	:	2,1847	:	4
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0696	:	2,0686	:	2
4 4 0	:	1,9689	:	1,9692	:	48
5 4 1	:	1,7133	:	1,7189	:	3
6 2 2	:	1,6794	:	1,6794	:	48
4 4 4	:	1,6080	:	1,6079	:	13
8 0 0	:	1,3937	:	1,3927	:	8
6 6 2	:	1,2775	:	1,2778	:	19
8 4 0	:	1,2455	:	1,2454	:	18
8 4 4	:	1,1369	:	1,1369	:	17
	:		:		:	
	:		:		:	

$\text{Pb Nd}_4 \text{Mo}_3 \text{O}_{16}$ $a = (11,090 \pm 0,002) \text{ \AA}$						
h k l	:	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	:	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,195	:	3,201	:	100
3 2 1	:	2,976	:	2,963	:	2
4 0 0	:	2,769	:	2,772	:	34
4 2 1	:	2,4274	:	2,4200	:	2
3 3 2	:	2,3658	:	2,3643	:	4
4 3 1	:	2,1740	:	2,1749	:	6
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0650	:	2,0593	:	3
4 4 0	:	1,9631	:	1,9604	:	41
6 0 2	:	1,6740	:	1,6718	:	41
4 4 4	:	1,6005	:	1,6007	:	13
8 0 0	:	1,3855	:	1,3862	:	9
6 6 2	:	1,2716	:	1,2721	:	23
8 4 0	:	1,2400	:	1,2398	:	20
	:		:		:	
	:		:		:	

Pb Sn ₁₄ Mo ₃ (16)						
a = (11,010 ± 0,005) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
2 2 2	:	3,184	:	3,180	:	100
	:		:		:	
4 0 0	:	2,753	:	2,754	:	38
	:		:		:	
4 3 1	:		:		:	
5 1 0	:	2,1575	:	2,1608	:	5
	:		:		:	
4 4 0	:	1,9473	:	1,9477	:	59
	:		:		:	
6 2 2	:	1,6609	:	1,6610	:	59
	:		:		:	
4 4 4	:	1,5913	:	1,5903	:	18
	:		:		:	
8 0 0	:	1,3774	:	1,3772	:	9
	:		:		:	
6 6 2	:	1,2636	:	1,2638	:	25
	:		:		:	
8 4 0	:	1,2319	:	1,2318	:	23
	:		:		:	

Pb Eu ₄ Mo ₃ O ₁₆ a = (10,83 ± 0,01) Å				Pb Eu ₄ Mo ₂ W O ₁₆ a = (10,795 ± 0,005) Å			
h k l	d _{exp} (Å)	d _{th} (Å)	I/I ₀	h k l	d _{exp} (Å)	d _{th} (Å)	I/I ₀
2 2 2	3,114	3,126	100	2 2 2	3,114	3,116	100
4 0 0	2,7072	2,7075	32	4 0 0	2,6960	2,6987	36
4 4 0	1,9125	1,9145	40	4 4 0	1,9100	1,9083	50
6 2 2	1,6327	1,6327	32	6 2 2	1,6256	1,6274	40
4 4 4	1,5642	1,5632	13	4 4 4	1,5578	1,5581	13
8 0 0	1,3525	1,3537	7	8 0 0	1,3450	1,3494	7
6 6 2	1,2414	1,2493	18	6 6 2	1,2391	1,2383	25
8 4 0	1,2097	1,2108	13	8 4 0	1,2065	1,2069	20
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:

(Nd _{0,5} Y _{0,5})La ₆ Mo ₄ O ₂₂						
a = (11,216 ± 0,002) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
2 2 2	:	3,236	:	3,237	:	100
3 2 1	:	2,996	:	2,997	:	3
4 0 0	:	2,805	:	2,804	:	41
4 2 1	:	2,4466	:	2,4475	:	4
3 3 2	:	2,3910	:	2,3912	:	4
4 3 1	:	2,1998	:	2,1996	:	4
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0840	:	2,0827	:	4
4 4 0	:	1,9823	:	1,9827	:	61
5 4 1	:	1,7326	:	1,7306	:	3
6 2 2	:	1,6924	:	1,6908	:	55
4 4 4	:	1,6168	:	1,6188	:	14
5 5 2	:		:		:	
6 3 3	:	1,5260	:	1,5263	:	3
7 2 1	:		:		:	
6 5 1	:		:		:	
7 3 2	:	1,4250	:	1,4244	:	3
8 0 0	:	1,4016	:	1,4020	:	11
5 5 4	:		:		:	
7 4 1	:	1,3803	:	1,3805	:	3
8 1 1	:		:		:	
6 6 2	:	1,2857	:	1,2865	:	24
8 4 0	:	1,2538	:	1,2539	:	16
8 4 4	:	1,1445	:	1,1447	:	14
6 6 6	:		:		:	
10.2.2	:	1,0790	:	1,0790	:	14
8 8 0	:	0,9915	:	0,9913	:	6
10.6.2	:	0,9479	:	0,9477	:	14
12.0.0	:		:		:	
8 8 4	:	0,9345	:	0,9347	:	10
12.4.0	:	0,8867	:	0,8867	:	6
10.6.6	:	0,8588	:	0,8588	:	7

(Nd _{0,5} Y _{0,5})La ₂ Mo ₃ WO ₁₂						
a = (11,204 ± 0,002) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I _c
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,234	:	3,234	:	100
4 0 0	:	2,800	:	2,801	:	46
4 2 1	:	2,4456	:	2,4449	:	3
3 3 2	:	2,3878	:	2,3887	:	3
4 3 1	:	2,1973	:	2,1972	:	3
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0800	:	2,0805	:	3
4 4 0	:	1,9826	:	1,9806	:	67
6 2 2	:	1,6893	:	1,6890	:	59
4 4 4	:	1,6158	:	1,6171	:	13
8 0 0	:	1,4002	:	1,4005	:	10
6 6 2	:	1,2858	:	1,2851	:	30
8 4 0	:	1,2525	:	1,2526	:	16
8 4 4	:	1,1445	:	1,1435	:	19
6 6 6	:		:		:	
10.2.2	:	1,1788	:	1,1788	:	12
8 8 0	:	0,9911	:	0,9903	:	7
	:		:		:	
	:		:		:	

$\text{Li La}_4\text{Mo}_3\text{O}_{15}\text{F}$ $a = (11,246 \pm 0,002) \text{ \AA}$						
h k l	:	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	:	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,243	:	3,246	:	100
3 2 1	:	3,002	:	3,005	:	2
4 0 0	:	2,809	:	2,811	:	35
4 2 1	:	2,4526	:	2,4540	:	2
3 3 2	:	2,3977	:	2,3976	:	4
4 3 1	:	2,2051	:	2,2055	:	4
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0898	:	2,0883	:	2
4 4 0	:	1,9872	:	1,9880	:	53
6 2 2	:	1,6938	:	1,6953	:	50
4 4 4	:	1,6237	:	1,6232	:	13
8 0 0	:	1,4029	:	1,4057	:	6
5 5 4	:		:		:	
7 4 1	:	1,3832	:	1,3842	:	2
8 1 1	:		:		:	
6 6 2	:	1,2898	:	1,2900	:	18
8 4 0	:	1,2563	:	1,2573	:	15
8 4 4	:	1,1480	:	1,1477	:	12
	:		:		:	
	:		:		:	

LiPr ₄ Mo ₃ O ₁₅ F						
a = (11,086 ± 0,002) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,209	:	3,200	:	100
3 2 1	:	2,972	:	2,962	:	3
4 0 0	:	2,774	:	2,771	:	35
4 2 1	:	2,4211	:	2,4191	:	3
3 3 2	:	2,3635	:	2,3635	:	5
4 3 1	:	2,1741	:	2,1741	:	5
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0544	:	2,0586	:	2
4 4 0	:	1,9592	:	1,9597	:	45
5 4 1	:	1,7077	:	1,7106	:	4
6 2 2	:	1,6703	:	1,6712	:	39
4 4 4	:	1,5989	:	1,6001	:	14
5 5 2	:		:		:	
6 3 3	:	1,5078	:	1,5086	:	3
7 2 1	:		:		:	
6 5 1	:	1,4065	:	1,4079	:	3
7 3 2	:		:		:	
8 0 0	:	1,3846	:	1,3857	:	7
6 6 2	:	1,2697	:	1,2716	:	20
8 4 0	:	1,2373	:	1,2394	:	18
	:		:		:	
	:		:		:	

LiNd ₄ Mo ₃ O ₁₅ F						
a = (11,050 ± 0,002) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,195	:	3,189	:	100
3 2 1	:	2,960	:	2,953	:	1
4 0 0	:	2,766	:	2,762	:	41
4 2 1	:	2,4120	:	2,4113	:	4
3 3 2	:	2,3567	:	2,3558	:	2
4 3 1	:	2,1646	:	2,1670	:	3
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0519	:	2,0519	:	1
4 4 0	:	1,9584	:	1,9533	:	56
5 4 1	:	1,7023	:	1,7050	:	3
6 2 2	:	1,6681	:	1,6658	:	51
4 4 4	:	1,5948	:	1,5949	:	16
5 5 2	:		:		:	
6 3 3	:	1,5045	:	1,5037	:	2
7 2 1	:		:		:	
6 5 1	:	1,4052	:	1,4033	:	1
7 3 2	:		:		:	
8 0 0	:	1,3820	:	1,3812	:	7
5 5 4	:		:		:	
7 4 1	:	1,3603	:	1,3601	:	1
8 1 1	:		:		:	
6 6 2	:	1,2668	:	1,2675	:	22
8 4 0	:	1,2354	:	1,2354	:	18
	:		:		:	
	:		:		:	

LiLu ₄ Mo ₃ C ₁₅ F						
a = (10,98 ± 0,005) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,164	:	3,169	:	100
	:		:		:	
4 0 0	:	2,744	:	2,745	:	30
	:		:		:	
4 4 0	:	1,9410	:	1,941	:	45
	:		:		:	
6 2 2	:	1,6560	:	1,6552	:	35
	:		:		:	
4 4 4	:	1,5838	:	1,5848	:	15
	:		:		:	
8 0 0	:	1,3722	:	1,3725	:	7
	:		:		:	
6 6 2	:	1,2596	:	1,2594	:	20
	:		:		:	
8 4 0	:	1,2280	:	1,2276	:	15
	:		:		:	
	:		:		:	

NaPr ₄ Mo ₃ O ₁₅ F						
a = (11,090 ± 0,005) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,198	:	3,201	:	100
3 2 1	:	2,976	:	2,963	:	2
4 0 0	:	2,773	:	2,772	:	34
4 2 1	:	2,4187	:	2,4200	:	3
3 3 2	:	2,3658	:	2,3643	:	3
4 3 1	:	2,1741	:	2,1749	:	4
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,0606	:	2,0593	:	3
4 4 0	:	1,9600	:	1,9604	:	56
5 3 0	:		:		:	
4 3 3	:	1,9015	:	1,9019	:	2
5 4 1	:	1,7099	:	1,7112	:	2
6 2 2	:	1,6715	:	1,6718	:	48
4 4 4	:	1,5989	:	1,6007	:	13
8 0 0	:	1,3846	:	1,3862	:	8
6 6 2	:	1,2717	:	1,2721	:	19
8 4 0	:	1,2392	:	1,2398	:	15
	:		:		:	
	:		:		:	

Na Nd ₄ Mo ₃ O ₁₅ F				Na Nd ₄ Mo ₃ O ₁₅ F			
$a = (11,032 \pm 0,005) \text{ \AA}$ Préparé à 700°				$a = (11,090 \pm 0,002) \text{ \AA}$ Préparé à 900°			
h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	I/I ₀	h k l	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	I/I ₀
2 2 2	3,184	3,184	100	2 2 2	3,206	3,201	100
4 0 0	2,759	2,758	30	3 2 1	2,962	2,963	3
4 4 0	1,9520	1,9502	47	4 0 0	2,772	2,772	28
6 2 2	1,6631	1,6631	35	4 2 1	2,4195	2,4200	3
4 4 4	1,5920	1,5923	12	3 3 2	2,3636	2,3643	4
8 0 0	1,3778	1,3790	6	4 3 1	2,1748	2,1749	4
6 6 2	1,2653	1,2654	18	5 1 0	2,0598	2,0593	3
8 4 0	1,2333	1,2334	16	4 3 2	1,9592	1,9604	51
				5 3 0	1,8998	1,9019	2
				4 3 3	1,7126	1,7117	2
				6 2 2	1,6709	1,6718	41
				4 4 4	1,5989	1,6007	12
				5 5 2			
				6 3 3	1,5078	1,5091	2
				7 2 1			
				6 5 1	1,4068	1,4084	2
				7 3 2			
				8 0 0	1,3834	1,3862	7
				5 5 4			
				7 4 1	1,3645	1,3650	2
				8 1 1			
				6 6 2	1,2703	1,2721	18
				8 4 0	1,2393	1,2398	17

$\text{Na}_4\text{Mn}_4\text{O}_{15}\text{F}$ $a = (10,903 \pm 0,005) \text{ \AA}$						
h k l	:	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	:	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	:	I/I ₀
2 2 2	:	3,146	:	3,147	:	100
4 0 0	:	2,7266	:	2,7257	:	30
4 4 0	:	1,9271	:	1,9273	:	43
6 2 2	:	1,6425	:	1,6436	:	30
4 4 4	:	1,5734	:	1,5737	:	11
8 0 0	:	1,3624	:	1,3628	:	6
6 6 2	:	1,2510	:	1,2506	:	17
8 4 0	:	1,2187	:	1,2189	:	15

$\text{KLn}_4\text{HfO}_3\text{F}_{15}$ $a = (11,333 \pm 0,002) \text{ \AA}$						
h k l	:	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	:	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	:	I/I ₀
	:		:		:	
	:		:		:	
	:		:		:	
2 2 2	:	3,271	:	3,271	:	100
3 2 1	:	3,027	:	3,028	:	3
4 0 0	:	2,8342	:	2,8332	:	38
4 2 1	:	2,4725	:	2,4730	:	3
3 3 2	:	2,4143	:	2,4162	:	3
4 3 1	:	2,2205	:	2,2225	:	4
5 1 0	:		:		:	
4 3 2	:	2,1068	:	2,1044	:	2
4 4 0	:	2,0036	:	2,0034	:	48
6 2 2	:	1,7084	:	1,7085	:	44
4 4 4	:	1,6353	:	1,6357	:	12
8 0 0	:	1,4162	:	1,4166	:	6
6 6 2	:	1,2997	:	1,2999	:	17
8 4 0	:	1,2666	:	1,2670	:	14
	:		:		:	
	:		:		:	

$\text{KPr}_4\text{Fe}_3\text{O}_{15}\text{F}$ $a = (11,17 \pm 0,05) \text{ \AA}$						
h k l	:	$d_{\text{exp}}(\text{\AA})$	:	$d_{\text{th}}(\text{\AA})$	:	I/I ₀
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
2 2 2	:	3,224	:	3,224	:	100
3 2 1	:	2,984	:	2,985	:	3
4 0 0	:	2,794	:	2,792	:	31
4 2 1	:	2,4356	:	2,4374	:	4
3 3 2	:	2,3810	:	2,3814	:	4
4 3 1	:	2,1920	:	2,1906	:	4
5 1 0	:	:	:	:	:	:
4 3 2	:	2,0741	:	2,0742	:	3
4 4 0	:	1,9738	:	1,9745	:	46
5 3 0	:	1,9138	:	1,9156	:	3
4 3 3	:	:	:	:	:	:
5 4 1	:	1,7240	:	1,7235	:	3
6 2 2	:	1,6845	:	1,6839	:	39
4 4 4	:	1,6127	:	1,6122	:	13
8 0 0	:	1,3974	:	1,3962	:	7
6 6 2	:	1,2813	:	1,2812	:	16
8 4 0	:	1,2491	:	1,2488	:	13
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:

KNd ₄ P ₃ O ₁₅						
a = (11,105 ± 0,02) Å						
h k l	:	d _{exp} (Å)	:	d _{th} (Å)	:	I/I ₀
2 2 2	:	3,210	:	3,205	:	100
4 0 0	:	2,777	:	2,776	:	34
4 4 0	:	1,9624	:	1,9631	:	43
6 2 2	:	1,6730	:	1,6741	:	39
4 4 4	:	1,6025	:	1,6028	:	15
8 0 0	:	1,3902	:	1,3881	:	7
6 6 2	:	1,2733	:	1,2738	:	15
8 4 0	:	1,2413	:	1,2415	:	12

B I B L I O G R A P H I E

-:-:-:-:-

- (1) A.L. ZELIKMAN - L.V. BELIAEVSKAYA J. Appl. Chem. USSR 27, 1091 (1955)
- (2) A.K. ZELIKMAN Zhur. Néorg. Khim. 2778 (1956)
- (3) D.K. KUNEV - L.V. BELIAEVSKAYA - A.M. ZELIKMAN Russian journal of
Inorg. Chem. 11, (8),
1063 (1966)
- (4) M.V. NOKHOSEV - V.I. KRIVOBCE - S.M. ALEIKINA Iso. Akad. Nauk. SSSR
N.S. ZHIGULINA - N.G. KISEL Néorg. Mater. 3, (9)
1657 (1957)
- (5) I.A. PURAVEVA - T.D. BELOVA - L.M. KOVBA Vest. Moskov. Univ.
V.K. TRUNOV 2, 23 (1), 116 (1968)
- (6) P.V. KLEVTSOV - L.P. KOZIEVA Dokl. Akad. Nauk. SSSR 185, (3), 571
(1969)
- (7) I.V. NOKHOSOV - E.I. GET'MAN - F.P. ALEKSEEV Dokl. Akad. Nauk. SSSR
185, (2), 361 (1969)
- (8) V.I. SPITSYN - V.K. TRUNOV Dokl. Akad. Nauk. SSSR 185 (4), 854, (1969)
- (9) L.G. VAN UITERT - J.J. RUBIN - W.A. BONNER J. Am. Ceram. Soc. 46,
(10) 512, (1963)
- (10) K. NASSAU - L.G. VAN UITERT J. Appl. Phys. 31, (8), 1508, (1960)
- (11) S. PREZIOSI - R.R. SODEN - L.G. VAN UITERT J. Appl. Phys. 33, (5),
1893, (1962)
- (12) L.G. VAN UITERT - S. PREZIOSI J. Appl. Phys. 33, (9), 2908 (1962)
- (13) S.C. ABRAHAMS J. Chem. Phys. 46, (6), 2052, (1967)
- (14) S.C. ABRAHAMS - J.L. BERNSTEIN - P.B. JARIESON J. Chem. Phys. 48,
(6), 2619, (1968)
- (15) J.P. FOURNIER Thèse 3ième cycle Clermont (1970)
- (16) I.D. THOMAS - A. HERZOG - D.M. LACHLAN Acta. Cryst. (9) 316 (1956)

- (17) A.L. GRIGORYAN - M.A. ENFIADZHYAN Sb. Nauchn. Tr. Mrevansk.
Politekh. Inst. 16,
131, (1958)
- (18) N.A. BATRAKOV Sklar. Keram. 12, 147, (1962)
- (19) W.P. DOYLE - G.Me GUIRE - G.M. CLARK. J. Inorg. Nucl. Chem. 28,
1185, (1966)
- (20) F. KOSEK - J. SOMMER - Z. CIMPL Collec. Czech. Chem. Commun 32,
430 (1967)
- (21) R. KOHLMULLER - J.P. FAURIE C. R. Acad. Sc. Paris 264, 1751 (1967)
- (22) K. NASSAU - S.C. ABRAHAMS J. Cryst. Growth 2 (3) 136 (1968)
- (23) K. NASSAU - J.W. SHIEVER J. Am. Ceram. Soc. 52 (1), 36, (1969)
- (24) Y. TRAMBOUZE - Y. COLLEVILLE - TRAN HUU THE C. R. Acad. Paris
242, 497, (1956)
- (25) A.N. ZOBNINA - I.P. KILLYAKOV Isv. Akad.Nauk SSSR Néorg. Mater.
2, (3), 511, (1966)
- (26) A.N. ZOBNINA - I.P. KILLYAKOV Isv. Akad.Nauk SSSR Néorg. Mater.
2, (12), 2199, (1966)
- (27) A.N. ZOBNINA - I.P. KILLYAKOV Isv. Akad.Nauk SSSR Néorg. Mater.
5, (8), 1472, (1969)
- (28) R. KOHLMULLER - J.P. FAURIE Bull. Soc. Chim. 11, 4379, (1968)
- (29) R.W.G. WYCKOFF J. Amer. Chem. Soc. 44, 1994, (1922)
- (30) E.K. BROCH - I. SKRIFTE OSLO - VIDENKAPS Akad., Mat., Natur, Klasse
8, 61, (1929)
- (31) P. CAILLET Bull. Soc. Chim. 4750, (1967)
- (32) F. HOERMANN - Z. Anorg. Chem. 177, 154, (1928)
- (33) B.M. GATEHOUSE - P. LEVERETT J. Chem. Soc. (A) 6, 1398, (1968)
- (34) B.M. GATEHOUSE - H. BRYAN - P. LEVERETT J. Chem. Soc. (D) 19,
1093, (1969)
- (35) R.J. WYCKOFF J. Am. Chem. Soc. 44, 1994, (1922)

- (36) W. ZACHARLASEN - Norsk Géol. Tidsk. 9, 65, (1926)
- (37) V.M. GOLDSCHMIDT Géochemische. Verteilungsgesetze VII, 160, (1900)
- (38) R.C. EVANS Crystal Chem. 264, (1946)
- (39) J. LINDQVIST Acta. Chem. Scand. 4, 1066, (1950)
- (40) M. SILTBORG Acta. Chem. Scand. 21, 499, (1967)
- (41) I.N. BELYAEV - V.S. FILIP'EV - E.G. FESENKO - Zh. Strukt. Kim.
4, (5), 719, (1963)
- (42) I.A. VASIL'EVA - Y.A.I. GERASIMOVA - Y.P. SIMANOV - Zhur. Fiz. Khim.
T.N. RESUKHINA 31, 825, (1957)
- (43) L.E. CONROY - M.J. SIENKO J. Am. Chem. Soc. 79, 4048, (1957)
- (44) E.J. FRESIA - L. KATZ - R. WARD J. Am. Chem. Soc. 81, 4783, (1959)
- (45) F. KOSEK - J. HORAK - J. KASPAR Ceskoslov Casopis Fys. 11, 133 (1961)
- (46) SMOLENSKII - AGRANOVSKAYA Moscov Akad. Nauk SSSR Sbornik 336, (1960)
- (47) R.D. SHAPOVALOVA - V.I. BELOVA - A.M. ZALESSKI Zhur. Fiz. Khim.
Y.I. GERASIMOV 35, 2713, (1961)
- (48) P.F. WELLER Dissertation Abstr. 22, 4178, (1962)
- (49) I.N. POLANDOV Fiz. Tverd. Tela. 5, 1147, (1963)
- (50) V.S. FILIP'EV - M.F. KUPRIANOV - E.G. FESENKO Kristallografiya
8, (5), 790, (1963)
- (51) E.G. FESENKO - V.S. FILIP'EV - M.F. KUPRIANOV Izv. Akad. Nauk SSSR
Ser. Fiz. 28, (4),
669, (1964)
- (52) L.G. VAN UITERT - R.C. SHERWOOD - H.J. WILLIAMS J. Phys. Chem.
J.J. RUBIN - W.A. BONNER Solids. 25, (12)
1447
- (53) C. BLASSE Philips Res. Rept 20, 327 (1965)
- (54) I.N. BELYAEV - L.I. MEDVEDEVA - E.G. FESENKO Isv. Akad. Nauk SSSR
M.F. KUPRIANOV Neorg. Mater. 1, (6)
924, (1965)
- (55) E. GERLERT - L. KILBORG Acta Chem. Scand. 21, (9), 2575, (1967)
- (56) J.P. FAURIE - R. KOHLMULLER C.R. Acad. Sc. Paris 269, 523, (1969)
- (57) SILLEN - LUNGBERG Z. Anorg. Chem 252, 2 (1954)
- (58) G. BLASSE J. Inorg. Nucl. Chem. 28, (6 - 7) 1488, (1966)
- (59) W.E. SHARP Z. Krist. 114, 151, (1960)
- (60) J.P. FAURIE - B. BOURDET C.R. Acad. Sc. Paris (à paraître)
- (61) P.V. KLEVTSOV - KOZMEKA L.P. Dokl. Akad. Nauk SSSR 185, (3), 571
(1969)

- (62) M.V. MOKOSEV - E.I. GET'MAN - F.P. ALEKSEEV Dokl. Akad. Nauk
SSSR, 185, (2), 361,
(1969)
- (63) V.I. SPITSYN - V.K. TRUNOV Dokl. Akad. Nauk SSSR 185, (4), 851,
(1969)
- (64) A.P. YOUNG - C.M. SCHWARTZ Science 141, 348, (1963)
- (65) A.W. SLEIGHT - B.L. CHAMBERLAND Inorg. Chem. 7 (8), 1672, (1968)
- (66) A. MICHEL phénomènes magnétiques et structures Masson et Cie Paris
- (67) VAN VLECK The Theory of electric and magnetic susceptibilities
Oxford University Press (1931)
- (68) G.D. RIECK Rec. Trav. Chim. 62, 429 (1943)
- (69) R.H. BUSEY O.L. KELLER Jr J. Chem. Phys. 41, 215, (1964)
- (70) G.M. CLARK - W.P. DOYLE Spectrochim. Acta. 22, (8), 1441, (1966)
- (71) A.S. BARKER Phys. Rev. 135 A 742, (1964)
- (72) J.P. RUSSEL - R. LOUDON Proc. Phys. Soc. 85 1029, (1965)
- (73) R.K. KHANNA - E.R. LIPPINCOTT Spectrochim. Acta. (A) 24, (7), 905
(1968)
- (74) B.E. ZAITSEV - E.I. ZAKARIKOVA - B.N. IVANOV - EMIN Zhur. Neorg.
G.I. CHERENKOVA Khim. 14, (6)
1493, (1969)
- (75) M.J. SCHWING-WEILL - F. ARNAUD-NEU Bull. Soc. Chim. 3, 853, (1970)
- (76) F.A. MILLER - C.H. WILKINS Anal. Chem. 24, 1253, (1952)
- (77) SILLEN - LUNDBORG Z. Anorg. Allg. Chem. 252, 2, (1943)
- (78) B. AURIVILLIUS Ark. Chem. 5, 39, (1952)
- (79) F.A. COTTON Chemical applications of group theory John Wiley et
Sons Inc. New-York (1963)
- (80) OFFELT - J. Chem. Phys. 38, 2171, (1963)
- (81) A. BRIL - W.L. WANMAKER C.D.I.C. DE LAAT J. Electrochem. Soc.
112, 111, (1965)
- (82) CHANG - GRUBER J. Chem Phys. 41, 3227, (1964)

- (83) C. LINARES *Le Journal de Physique* 29, 917, (1968)
- (84) G. BLASSE *Mater. Res. Bull.* 3, 10, 807, (1968)
- (85) L.G. VAN UITERT - R.R. SODEN *J. Chem Phys.* 32, 1687, (1960)
- (86) L.G. VAN UITERT - R.R. SODEN - R.C. LINARES *J. Chem. Phys.*
36, 1793, (1962)
- (87) L.G. VAN UITERT *J. Chem. Phys.* 37, 981, (1962)
- (88) L.G. VAN UITERT *J. Electrochem. Soc.* 110, 46, (1963)
- (89) LUMINESCENCE of Inorganic Solids., 465, Edited by P.GOLDBERG
ACADEMIC PRESS (1966)
- (90) G. BLASSE - A. BRIL *J. Chem. Phys.* 45, 7, 2350, (1966)
- (91) H.J. BORCHARDT *J. Chem. Phys.* 39, 504, (1963)
- (92) G. BLASSE - A. BRIL *Philips Res. Reports* 21, 368, (1966)
- (93) C. LINARES - F. GAUME-MAHN *C.R. Acad. SC. Paris* 267 (B), 1094
(1968)
- (94) L. SUCHOW *J. Inorg. Nucl. Chem.* 30, 87, (1968)

TABLE des MATIERES

:--:-:-:-:-

Page

INTRODUCTION

1

CHAPITRE I : Diagrammes d'équilibre Liquides - Solides des Systèmes Binaires

- MoO_3 - MO ($\text{M} = \text{Cu}, \text{Zn}, \text{Cd}$)

- MoO_3 - Ag_2MoO_4

- MoO_3 - Ag_2WO_4

Etude dans l'état solide des systèmes

- WO_3 - CuO

- MoO_3 - WO_3 - CuO

I -	Système MoO_3 - CuO	6
II -	" MoO_3 - ZnO	19
III -	" MoO_3 - CdO	25
IV -	" MoO_3 - Ag_2MoO_4	27
V -	" MoO_3 - Ag_2WO_4	40
VI -	" WO_3 - CuO	46
VII -	" MoO_3 - WO_3 - CuO	49

CHAPITRE II : Etude des phases

- $\text{MLn}_4\text{Mo}_3\text{O}_{16}$ ($\text{M} = \text{Cd}, \text{Pb}$)

- $\text{MLn}_6\text{Mo}_4\text{O}_{22}$ ($\text{M} = \text{Ca}, \text{Sr}, \text{Pb}$)

et de quelques substitutions

PARTIE I - Préparation des phases

I - Systemes Ln_2MoO_6 - MMoO_6	54
II - Substitutions	58
III - Composés du Cérium	63

PARTIE II - Etude Structurale

I - Introduction	66
II - Etude des paramètres. Détermination du nombre Z	69
III - Mesures magnétiques	75
IV - Luminescence cristalline	85
V - Etude des Spectres d'absorption dans l'IR	112
VI - Hypothèse structurale	122

CHAPITRE III : Modes opératoires et Techniques d'études

I - Produits utilisés	145
II - Techniques d'études	147

RESUME et CONCLUSION	152
----------------------	-----

DIFFRACTOGRAMMES	157
------------------	-----

BIBLIOGRAPHIE	200
---------------	-----

Série : E

N° : 124

VU ET PERMIS D'IMPRIMER

(Décret n° 67-750 du 29 Août 1967)

Clermont-Ferrand, le 21 Avril 1970.

Le Doyen,

Moulin
R. KOHLMULLER

